

Kåvepenin PO, oral suspension 100 mg/mL

Phenoxyethylpenicillin

Flera styrkor finns, kontrollera att du använder rätt instruktion.

Hållbarhet preparat:

Kåvepenin (Registrerad Produkt)

- 100 mg/mL, Oral suspension, Hållbar: Beställs färdigberedd från Apoteket och förvaras i kyl max 14 dygn.

Arbetsmiljö

Allergisk, hanteras enl läkemedelsinstruktioner., Penicilliner kan ge allergi vid inandning, hudkontakt och förtäring. Långvarig eller upprepad inandning eller hudkontakt kan ge allergiska reaktioner

Administreringsätt

Skakas väl innan användning.

Oralt

Enteralt i sond: Går att ge i sond.

Vanlig indikation och dos

Akut otitis media

25 mg/kg x 3 i 5 dygn (max 6 g/dygn)

Vid recidiv behandling i 10 dygn (max 6 g /dygn)

Pneumoni

Barn under 5 år: 25 mg/kg x 3 i 5 - 7 dygn (max 6 g/dygn)

Barn över 5 år: 25 mg/kg x 3 i 7 dygn (max 6 g/dygn)

Akut sinuit

25 mg/kg x 3 i 7 - 10 dygn (max 6 g/dygn)

Faryngotonsillit

12,5 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 3 g/dygn)

Tandabscess

25 mg/kg x 3 i 7 - 10 dygn (max 6 g/dygn)

Borrelia Erytema Migrans

25 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 3 g/dygn)

Penicillinprovokation

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-04-20 15:15:46

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-04-21 15:39:20

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 1349

ID/spårnummer: 654

Giltig fr o m: 2015-04-21 15:39:20

Utskriftsdatum: 2015-04-21

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Kåvepenin PO, oral suspension 100 mg/mL

Phenoxymethylpenicillin

Flera styrkor finns, kontrollera att du använder rätt instruktion.

25 mg/kg som engångsdos i infektionsfritt intervall eller i samband med behandlingskrävande infektion.

| Rimlig dos för barn | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 50 kg |
|---------------------|---------|--------|--------|---------|
| 12,5 mg/kg/dos | 0,12 mL | 0,6 mL | 1,2 mL | 6,2 mL |
| 25 mg/kg/dos | 0,25 mL | 1,2 mL | 2,5 mL | 12,5 mL |

Övrig information Absorberas till ca 50%, samtidigt födointag medför minskad absorptionsgrad. Observera att det är stor variation i absorptionsgrad för prematurer.

Referens/Länk

FASS , Hämtat: 2014-02-27

<http://www.fass.se/LIF/substance76&userType=0&substancelid=>

Internetadress Barnallergisektionen Handläggning av misstänkta överkänslighetsreaktioner mot beta-laktam antibiotika, Hämtat: 2014-07-30

http://www.barnallergisektionen.se/stenciler_nya06/D14_antibiotika.pdf

Rekommendation ,(Grade 1B), Hämtat: 2013-11-12

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Rekommendation Läkemedelsverket, Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård., Hämtat: 2014-08-21

<http://www.lakemedelsverket.se//Alla-nyheter/Nyheter-2013/Uppdaterad-broschyr-om-behandling-av-vanliga-infektioner/>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-04-20 15:15:46

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-04-21 15:39:20

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 1349

ID/spårnummer: 654

Giltig fr o m: 2015-04-21 15:39:20

Utskriftsdatum: 2015-04-21

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

