

## Konakion Novum IM inj, IV inj 10 mg/ml

OBS Flera administreringsätt finns. Kontrollera att rätt instruktion används.

### Hållbarhet och beredningsform

Konakion Novum (Registrerad Produkt)

- 10 mg/mL, Injektionsvätska, lösning, Hållbar: Förvaras vid högst 25 C. Får ej frysas. Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Sparas inte efter första uttag. Resterande lösning får ej sparas

### Administreringsätt

Vid IV inj max 1 mg/min

### Vanlig indikation

Förebyggande av blödning till nyfödda över 2,5 kg

Förebyggande av blödning till nyfödda under 2,5 kg

Behandling av K-vitaminbrist vid exempelvis leversjukdom.

### Vanlig dosering

1 mg x 1. IM inj föredras pga depåeffekt framför IV inj. Barn under 2,5 kg ska få 0,4 mg/kg.

Barn under 2,5 kg ska få 0,4 mg/kg. Detta ger dock mycket små volymer (0,04 ml/kg), vilka inte kan dras upp tillräckligt noggrant. Tillsvidare används därför 1 mg=0,1 ml även för denna patientgrupp.

0,1 mg/kg/dos alt 1-2 mg x 1 varje - var 3:e dag

### Rimlig dos för barn

Vid födelse 1 mg

**1 kg**

0,1 mL

**5 kg**

0,1 mL

**10 kg**

**50 kg**

### Substans

Phytomenadione, B02BA01

### Referens/Länk

FASS, Hämtat: 2014-02-27

<http://www.fass.se/LIF/substance?6&userType=0&substancelid=>

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2014-04-02 12:36:22

Fastställare/läkare: Ej Godkänt

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 1351

ID/spårnummer: 263

Giltig fr o m: 2014-04-02 12:36:22

Utskriftsdatum: 2014-04-02

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

