

# Fytomenadion intramuskulär, intravenös inj 10 mg/mL

## (Konakion Novum)

Flera administreringsätt finns. Kontrollera att rätt instruktion används.

Vätskan ska vara klar. Om den är grumlig eller om fassetparation skett ska ampullen kasseras.

### Administreringsätt

Intramuskulär injektion: Rekommenderad administreringsväg vid förebyggande av blödning hos nyfödda med tanke på depåeffekten.

Intravenös injektion: Ges långsamt under minst 30 sekunder. Max 1 mg/minut.

### Vanlig indikation och dos

#### Förebyggande av vitamin K-beroende blödning hos nyfödda

Fullgångna nyfödda: 1 mg, engångsdos

Underburna med födelsevikt mindre än 1,5 kg: 0,4 mg/kg, dock minst 0,5 mg, engångsdos

Underburna med födelsevikt från 1,5 kg: 1 mg, engångsdos

Engångsdosen bör i första hand ges intramuskulärt då intravenös administrering inte ger någon depåeffekt.

För peroral behandling, se annan instruktion.

#### Vitamin K-brist, inkl. vid leversjukdom, neonatal kolestas, neonatal hypoprotrombinemi samt vid svår blödning.

Barn 1 mån - 18 år: 1 mg/kg, max 10 mg. Ges intravenöst.

| Rimlig dos för barn | 1 kg    | 5 kg   | 10 kg | 50 kg |
|---------------------|---------|--------|-------|-------|
| Vid födelse 0,5 mg  | 0,05 mL |        |       |       |
| Vid födelse 1 mg    |         | 0,1 mL |       |       |
| 1 mg/kg             |         | 0,5 mL |       |       |
| Max 10 mg           |         |        | 1 mL  | 1 mL  |

### Hållbarhet preparat:

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-06-14 14:47:28  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-06-14 14:47:12  
Källa: www.eped.se  
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1351  
ID/spårnummer: 3356  
Giltig fr o m: 2017-06-14 14:47:12  
Utskriftsdatum: 2017-06-14

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



# Fytomenadion intramuskulär, intravenös inj 10 mg/mL (Konakion Novum)

Konakion Novum (registrerad produkt)

- 10 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

Hållbar: Förvaras vid högst 25 C. Får ej frysas. Förvaras i ytterkartongen.  
Ljuskänsligt. Resterande lösning, efter första uttag, får ej sparas.

---

## Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/htm>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Personlig kontakt Maria Magnusson, MD, Spec koagulation- och blödningsrubbningar, ALB

Rekommendation ,(Grade 2B)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

---

## Lokal länk

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjonet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#1351](http://eped.sll.sjonet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1351)

---

## Substansspecifika uppgifter

Phytomenadione, B02BA01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceld=IDE4POBZU95LTVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-06-14 14:47:28  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-06-14 14:47:12  
Källa: www.eped.se  
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1351  
ID/spårnummer: 3356  
Giltig fr o m: 2017-06-14 14:47:12  
Utskriftsdatum: 2017-06-14

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

