

Fytomenadion intramuskulär, intravenös inj 10 mg/mL

(Konakion Novum)

Flera administreringsätt finns. Kontrollera att rätt instruktion används.

Vätskan ska vara klar. Om den är grumlig eller om fassetparation skett ska ampullen kasseras.

Administreringsätt

Intramuskulär injektion: Rekommenderad administreringsväg vid förebyggande av blödning hos nyfödda med tanke på depåeffekten.

Intravenös injektion: Ges långsamt under minst 30 sekunder. Max 1 mg/minut.

Vanlig indikation och dos

Förebyggande av vitamin K-beroende blödning hos nyfödda

Fullgångna nyfödda: 1 mg, engångsdos

Underburna med födelsevikt mindre än 1,5 kg: 0,4 mg/kg, dock minst 0,5 mg = 0,05 mL (OBS liten volym), engångsdos

Underburna med födelsevikt från 1,5 kg: 1 mg, engångsdos

Engångsdosen bör i första hand ges intramuskulärt då intravenös administrering inte ger någon depåeffekt.

För peroral behandling, se annan instruktion.

Vitamin K-brist, inkl. vid leversjukdom, neonatal kolestas, neonatal hypoprotrombinemi samt vid svår blödning.

Barn 1 mån - 18 år: 1 mg/kg, max 10 mg. Ges intravenöst.

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
Vid födelse 0,5 mg	0,05 mL			
Vid födelse 1 mg		0,1 mL		
1 mg/kg		0,5 mL		
Max 10 mg			1 mL	1 mL

Hållbarhet preparat:

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-07-13 15:04:49
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-07-13 15:04:45
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1351
ID/spårnummer: 3511
Giltig fr o m: 2017-07-13 15:04:45
Utskriftsdatum: 2017-07-13

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Fytomenadion intramuskulär, intravenös inj 10 mg/mL (Konaktion Novum)

Konaktion Novum (registrerad produkt)

- 10 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

Hållbar: Förvaras vid högst 25 C. Får ej frysas. Förvaras i ytterkartongen.
Ljuskänsligt. Resterande lösning, efter första uttag, får ej sparas.

Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Personlig kontakt Maria Magnusson, MD, Spec koagulation- och blödningsrubbningar, ALB

Rekommendation ,(Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Lokal länk

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjonet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1351

Substansspecifika uppgifter

Phytomenadione, B02BA01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceld=IDE4POBZU95LTVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-07-13 15:04:49
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-07-13 15:04:45
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1351
ID/spårnummer: 3511
Giltig fr o m: 2017-07-13 15:04:45
Utskriftsdatum: 2017-07-13

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

