

Fytomenadion intramuskulär, intravenös inj 10 mg/mL (Vitamin K, Konakion Novum)

Flera administreringsätt finns. Kontrollera att rätt instruktion används.

Instruktionen gäller för: Färdigberedd injektionslösning Konakion Novum 10 mg/mL.

Beredningsinstruktion: Lösningen ska vara klar. Om den är grumlig eller om fassetparation skett ska ampullen kasseras.

Administreringsätt

Intramuskulär injektion:

Rekommenderad administreringsväg vid förebyggande av blödning hos nyfödda med tanke på depåeffekten.

Intravenös injektion:

Ges långsamt under minst 30 sekunder. Max 1 mg/minut.

Vanlig indikation och dos

Förebyggande av vitamin K-beroende blödning hos nyfödda

Fullgångna nyfödda: 1 mg, engångsdos

Prematurfödda med födelsevikt mindre än 1,5 kg:

0,4 mg/kg, dock minst 0,5 mg = 0,05 mL (OBS liten volym), engångsdos

Prematurfödda med födelsevikt från 1,5 kg: 1 mg, engångsdos

Engångsdosen bör i första hand ges intramuskulärt då intravenös administrering inte ger någon depåeffekt.

För peroral behandling, se annan instruktion.

Vitamin K-brist, inkl. vid leversjukdom, neonatal kolestas, neonatal hypoprotrombinemi samt vid svår blödning

Barn 0 - 18 år: 1 mg/kg, max 10 mg. Ges intravenöst.

| Rimlig dos för barn | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 50 kg |
|---------------------|---------|--------|-------|-------|
| Vid födelse 0,5 mg | 0,05 mL | | | |
| Vid födelse 1 mg | | 0,1 mL | | |

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2018-01-08 14:55:07

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-01-17 09:59:42

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sl.se

Läkemedelsnummer: 1351

ID/spårnummer: 4178

Giltig fr o m: 2018-01-17 09:59:42

Utskriftsdatum: 2018-01-18

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Fytomenadion intramuskulär, intravenös inj 10 mg/mL

(Vitamin K, Konakion Novum)

| Rimlig dos för barn | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 50 kg |
|---------------------|------|--------|-------|-------|
| 1 mg/kg, max 10 mg | | 0,5 mL | 1 mL | 1 mL |

Hållbarhet preparat:

Konakion Novum (registrerad produkt)

- 10 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

Hållbar: Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Resterande lösning, efter första uttag, får ej sparas.

Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Personlig kontakt Maria Magnusson, MD, Spec koagulation- och blödningsrubbningar, ALB Stockholm

Rekommendation ,(Grade 1C)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Lokal länk

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1351

Substansspecifika uppgifter

Phytomenadione, B02BA01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceid=IDE4POBZU95LTVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2018-01-08 14:55:07
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-01-17 09:59:42
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1351
ID/spårnummer: 4178
Giltig fr o m: 2018-01-17 09:59:42
Utskriftsdatum: 2018-01-18

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

