



Fytomenadion intramuskulär/intravenös inj 10 mg/mL

(Vitamin K, Konakion Novum)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Färdigberedd injektionslösning Konakion Novum 10 mg/mL, spädes ej.

Beredningsinstruktion:

Lösningen ska vara klar. Om den är grumlig eller om fas-separation skett ska ampullen kasseras.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intramuskulär injektion:

Rekommenderad administreringsväg vid förebyggande av blödning hos nyfödda med tanke på depåeffekten.

Intravenös injektion:

Ges långsamt under minst 30 sekunder. Max 1 mg/minut.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Fytomenadion (registrerad produkt)

10 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemp i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Resterande lösning, efter första uttag, får ej sparas.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Förebyggande av vitamin K-beroende blödning hos nyfödda

Engångsdosen bör i första hand ges intramuskulärt då intravenös administrering inte ger någon depåeffekt.

Fullgångna nyfödda: 1 mg, engångsdos

Prematurfödda med födelsevikt mindre än 1,5 kg:
0,4 mg/kg, dock minst 0,5 mg = 0,05 mL (OBS liten volym), engångsdos

Prematurfödda med födelsevikt från 1,5 kg: 1 mg, engångsdos

För peroral behandling, se annan instruktion.

Förvärvad vitamin K-brist, inkl. vid leversjukdom, neonatal kolestas, neonatal hypoprotrombinemi samt vid massiv blödning

Ges intravenöst.

Nyfödda: 0,3 - 1 mg/kg

Barn 1 mån - 18 år: 0,3 - 1 mg/kg, max 10 mg

Av tradition används dosen 1 mg/kg vanligen till leversjuka barn.

Reversering av allvarlig blödning sekundär till warfarin/antivitamin-K behandling

Ges intravenöst.

Barn 1 mån - 18 år: 0,3 mg/kg, max 10 mg

RIMLIG DOS FÖR 10 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
Vid födelse 0,5 mg	0,05 mL	-	-	-
Vid födelse 1 mg	-	0,1 mL	-	-
0,3 mg/kg, max 10 mg	0,03 mL	0,15 mL	0,3 mL	1 mL
1 mg/kg, max 10 mg	0,1 mL	0,5 mL	1 mL	1 mL



Fytomenadion intramuskulär/intravenös inj 10 mg/mL

(Vitamin K, Konaktion Novum)

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Svenska sällskapet för trombos och hemostas (SSTH), Hemostas vid allvarlig blödning

<http://www.ssth.se/lankar>

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation (Grade 1C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1351

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2018-08-27

ePedID: 1351

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-09-03

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-09-03

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT