



## Fytomenadion intramuskulär/intravenös inj 10 mg/mL

(Vitamin K, Konakion Novum)

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Färdigberedd injektionslösning Konakion Novum 10 mg/mL, spädes ej.

#### Beredningsinstruktion:

Lösningen ska vara klar. Om den är grumlig eller om fas-separation skett ska ampullen kasseras.

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Intramuskulär injektion:

Rekommenderad administreringsväg vid förebyggande av blödning hos nyfödda med tanke på depåeffekten.

Intravenös injektion:

Ges långsamt under minst 30 sekunder. Max 0,1 mL/min.

Vid behov kan lösningen spädas med natriumklorid 9 mg/mL eller glukos 50 mg/mL.

### ÖVRIG INFORMATION

Effekt ses 1 - 3 timmar efter intravenös administrering.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Fytomenadion (registrerad produkt)

10 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemp i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Resterande lösning, efter första uttag, får ej sparas.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Förebyggande av vitamin K-beroende blödning hos nyfödda

Engångsdosen bör i första hand ges intramuskulärt då intravenös administrering inte ger någon depåeffekt.

Prematurfödda med födelsevikt under 1,5 kg:  
0,5 mg (OBS liten volym), engångsdos

Fullgångna nyfödda samt prematurfödda med födelsevikt från 1,5 kg:  
1 mg, engångsdos

#### Förvärvad vitamin K-brist, inkl. vid leversjukdom, neonatal kolestas, neonatal hypoprotrombinemi samt vid massiv blödning

Ges intravenöst.

Nyfödda: 0,3 - 1 mg/kg x 1

Barn 1 mån - 18 år: 0,3 - 1 mg/kg x 1, max 10 mg/dos

Vid blödning ges engångsdos, som kan upprepas vid behov.

Av tradition används dosen 1 mg/kg vanligen till leversjuka barn.

#### Reversering av allvarlig blödning sekundär till warfarin/antivitamin-K behandling

Ges intravenöst.

Barn 1 mån - 18 år: 0,3 mg/kg, max 10 mg/dos

Dosen kan upprepas vid behov.

### RIMLIG DOS FÖR 10 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,5 mg	0,05 mL	-	-	-
1 mg	-	0,1 mL	-	-
0,3 mg/kg, max 10 mg	0,03 mL	0,15 mL	0,3 mL	1 mL
1 mg/kg, max 10 mg	0,1 mL	0,5 mL	1 mL	1 mL





## Fytomenadion intramuskulär/intravenös inj 10 mg/mL

(Vitamin K, Konaktion Novum)

### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Svenska sällskapet för trombos och hemostas (SSTH), Hemostas vid allvarlig blödning

<http://www.ssth.se/lankar>

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 1C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Neonatalföreningen - Nationella riktlinjer för vitamin K profylax

<http://neo.barnlakarforeningen.se/riktlinjer-varldprogram/>

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#1351](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1351)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2018-10-09

ePedID: 1351

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-10-18

Versionsnummer, major: 5

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2018-10-18

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**