

## Konakion Novum 10 mg/ml för ORALT bruk

OBS Flera administreringsätt finns. Kontrollera att rätt instruktion används.

### Ingen spädninginstruktion

#### Hållbarhet och beredningsform

Konakion Novum 1 (Registrerad Produkt)

- 10 mg/mL, Oral lösning, Hållbar: Förvaras vid högst 25 C. Får ej frysas. Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Sparas i kyl max 24 tim (för peroralt bruk).

#### Administreringsätt

Oralt: Mindre lättflytande, klar lösning, måste dras upp med nål och därefter sprutas in i en peroral spruta, ljuskänsligt, får ej användas om grumlig eller fas-separation skett

Enteralt i sond: Går att ge i sond.

#### Vanlig indikation

Neo: PO alternativ till IM inj som förebyggande av blödning enligt föräldrars önskemål och till barn med diagnosticerad blödarsjuka

#### Vanlig dosering

1 (alt 2) mg x 1. Ytterligare 4 mg fördelat på 2-4 doser ges under följande 6-8 v.

Neo: Behandling av K-vitaminbrist vid exempelvis leversjukdom.

1 mg x 1 varje - var tredje dag. Finns även orala droppar på licens se Ka-vit.

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
1 mg/kg	0,1 ml	0,5 ml		

#### Substans

Phytomenadione, B02BA01

#### Referens/Länk

FASS via fass.se

<http://www.fass.se/LIF/substance?6&userType=0&substancelid=>

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2013-11-14 08:19:53

Fastställare/läkare: Lars Naver 2013-11-15 08:24:00

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 1352

ID/spårnummer: 189

Giltig fr o m: 2013-11-15 08:24:00

Utskriftsdatum: 2013-11-15

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

