



Fytomenadion oralt 10 mg/mL

(Vitamin K, Konakion Novum)

Injektionsvätska för oralt bruk.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Injektionslösning 10 mg/mL för ORALT bruk (Konakion Novum)

Alternativa preparat är orala droppar 20 mg/mL (licens) och kapsel 1 mg (licens), se annan instruktion.

Beredningsinstruktion:

Dra upp lösningen ur ampullen, filterstrå/nål bör användas. Spruta därefter in lösningen i en oral spruta.

Lösningen är något trögflytande. Om den är grumlig eller om fas-separation skett ska ampullen kasseras.

ADMINISTRERING

Oralt

Enteralt

RIMLIG DOS för Fytomenadion oralt 10 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
1 mg	-	0,1 mL	-	-
2 mg	-	0,2 mL	-	-
1 mg/kg, max 10 mg	0,1 mL	0,5 mL	1 mL	1 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Fytomenadion (registrerad produkt)

10 mg/mL, Oral lösning

Förvaras i rumstemp i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Kan sparas i kylskåp i max 24 timmar (för oralt bruk).

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Förebyggande av vitamin K-beroende blödning hos fullgångna nyfödda,

ENDAST i de fall intramuskulär/intravenös injektion inte kan ges:

- misstänkt/diagnostiserad blödarsjuka
- vårdnadshavare önskar oralt alternativ

Fullgångna nyfödda:

Startdos: engångsdos 2 mg (0,2 mL)

Denna dos ges så snart som möjligt under första levnadsdygnet.

Därefter 1 mg 1 gång per vecka i 3 månader, vanligen ges då kapsel NeoKay, se annan instruktion.

Förvärd vitamin K-brist, inkl. vid leversjukdom, neonatal kolestas

Nyfödda: 1 mg/kg x 1

Barn 1 mån - 18 år: 1 mg/kg x 1, max 10 mg x 1

ÖVRIG INFORMATION

Oral profylax med vitamin K ska avbrytas om barnet i huvudsak (över 50 %) får sin näring via komjölsbaserad modersmjölk ersättning som är berikad med vitamin K.

Oral profylax med vitamin K kan vara otillräcklig hos barn med underliggande leversjukdom/kolestas eller malabsorption eller om modern behandlas med antikoagulantia, anti epileptika eller antituberkulostatika. Fortsatt behandling bör baseras på koagulationsstatus.

Doseringen för förebyggande av blödning hos nyfödda i denna instruktion är från Svenska Neonatalföreningens riktlinje, samt andra källor, och skiljer sig därför från doseringen i produktresumén.





Fytomenadion oralt 10 mg/mL

(Vitamin K, Konaktion Novum)

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Micromedex

NeoFax

Rekommendation , (Grade 1C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Neonatalföreningen - Nationella riktlinjer för vitamin K profylax

<https://neo.barnlakarforeningen.se/riktlinjer-varldprogram/forlossnings-och-bb-varld-2/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1352

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 1352

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-04-24

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT