

Kloralhydrat 70 mg/ml oral lösning

OBS Flera styrkor och administreringsätt finns. Kontrollera att rätt instruktion används.

Ingen spädningsinstruktion

Administreringsätt

Oralt

Enteralt i sond: Går att ge i sond

Vanlig indikation

Neo: Vid behov av sedering, t.ex. innan MR-undersökn

Vanlig dosering

Neo: 25 mg/kg inför undersökning

Rimlig dos för barn

25 mg/kg/dos

1 kg

0,4 ml

5 kg

1,8 ml

10 kg

50 kg

Övrigt

Starkt beroendeframkallande.

Upprepade doser ska ges med stor försiktighet till nyfödda pga risk för ackumulering.

Substans

Chloral hydrate, N05CC01

Referens/Länk

ATL Barn 2004 - Extemporeläkemedel i Sverige till Barn

Ped Dosage Handbook, Taketomo, <http://www.lexi.com>
http://online.lexi.com/crsql/servlet/crlonline?a=doc&bc=pdh_f&mn=&id=

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2013-11-13 20:26:52

Fastställare/läkare: Lars Naver 2013-11-15 07:55:07

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 1356

ID/spårnummer: 182

Giltig fr o m: 2013-11-15 07:55:07

Utskriftsdatum: 2013-11-15

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

