

# Klonidinhydroklorid oral lösning 5 mikrog/ml

Clonidine

Observera att det finns flera olika styrkor av oralt klonidin. Detta blad gäller oralt klonidin 5 mikrog/mL.

Spädes ej, extemporeberedd lösning från APL

## Hållbarhet preparat:

Klonidinhydroklorid (Extempore - Ej lagervara)

- 5 mikrog/mL, Oral lösning, Hållbar: Vid höga hygienkrav hållbar 1 mån efter första uttag, annars 6 mån

## Administreringsätt

Oralt: Om det är en premediceringsdos så ges den 40-60 minuter före planerad procedur. Maximal analgetisk effekt efter 60-90 minuter.

Enteralt i sond: Går att ges i sond. 95 % absorption från mag-tarmkanalen. Lättflytande klar vätska, Lätt doft, Flödar lätt i sond.

## Vanlig indikation och dos

Nyfödda: Smärta

- 1-3(-4) mikrog/kg/dos 3 gånger dagligen =
- 3-9 (-12) mikrog/kg/dygn, fördelat på 3-4 doser

Barn: Per oralt vb mot smärta, oro, opiatabstinens.

Barn: 1-3 mikrogram/kg/dos 3 gånger dagligen

Barn: Premedicinering inför procedur.

Barn: 2-3 mikrog/kg/dos, max 150 mikrog/dos

## Rimlig dos för barn

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
PO 1 mikrog/kg/dos	0,2 ml/dos	1 ml/dos	2 ml/dos	10 ml/dos
PO 3 mikrog/kg/dos	0,6 ml/dos	3 ml/dos	6 ml/dos	30 ml/dos

## Övrig information

Klonidin kan vara kontraindicerad hos barn med hjärtsjukdom, arrytmier och liknande besvär.

Klonidin ska ges med försiktighet vid hypovolemi eller hypotension då effekten kan bli ytterligare sänkt blodtryck med kliniska symtom.

## Referens/Länk

ATL Barn 2004 - Extemporeläkemedel i Sverige till Barn , Hämtat: 2013-11-12

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2013-10-29 08:33:28  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2013-11-12 12:37:40  
Källa: www.eped.se  
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 1358  
ID/spårnummer: 122  
Giltig fr o m: 2013-11-12 12:37:40  
Utskriftsdatum: 2015-06-22

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



## Klonidinhydroklorid oral lösning 5 mikrog/ml

Clonidine

Observera att det finns flera olika styrkor av oralt klonidin. Detta blad gäller oralt klonidin 5 mikrog/mL.

Rekommendation (Grade 2A), Hämtat: 2013-11-12

[http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Internetadress Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård - kunskapsdokument, Hämtat: 2015-03-24

<http://eped.se/referenser/>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Hämtat: 2015-06-18

<http://eped.se/referenser/>

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2013-10-29 08:33:28  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2013-11-12 12:37:40  
Källa: www.eped.se  
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 1358  
ID/spårnummer: 122  
Giltig fr o m: 2013-11-12 12:37:40  
Utskriftsdatum: 2015-06-22

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

