



Enoxaparinnatrium subkutan inj 10 mg/mL

(Klexane)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Spädning av förfylld spruta Klexane (enoxaparinnatrium) 10 000 E = 100 mg/mL till 10 mg/mL

EN-STEGSSPÄDNING

Klexane		NaCl 9 mg/mL		INJ LÖ
100 mg/mL				
0,2 mL	+	1,8 mL	=	10 mg/mL
				2 mL

Beredningsinstruktion:

Dra upp 1,8 mL NaCl i en intravenös spruta, dra sedan in lite luft i samma spruta. För sedan över 0,2 mL enoxaparinnatrium från den förfyllda sprutan till sprutan med NaCl. Blanda väl genom att försiktigt vända sprutan upp och ner. För administrering dras ordinerad dos upp i mindre spruta från den iordningställda lösningen.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Subkutan injektion

ÖVRIG INFORMATION

Injektionsflaskan för enoxaparinnatrium innehåller bensylalkohol och rekommenderas därför inte till nyfödda pga risk att utveckla "gaspings syndrome". Förfylld spruta innehåller inte bensylalkohol.

Vid sinustrombos rekommenderas tidigt kontakt med barnkoagulation alt koagulationsjour. Generellt behandlas sinustromboser olika utifrån eventuell förekomst av intrakraniell blödning.

Effekten av enoxaparinnatrium är nedsatt hos nyfödda pga. låga antitrombinnivåer i plasma. Därför är doseringen till nyfödda högre per kg kroppsvikt.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Klexane (registrerad produkt)

- 100 mg/mL, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta
HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25°C. Får ej frysas.
- 10 mg/mL, Injektionsvätska, lösning
HÅLLBAR: 12 tim i rumstemperatur

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Trombosprofylax vid kirurgi

Prematurfödda och fullgångna nyfödda: 0,75 mg/kg x 2
Barn under 2 mån: 0,75 mg/kg x 2
Barn 2 mån - 18 år: 0,5 mg/kg x 2

Djup ventrombos, lungemboli när trombolytisk behandling eller kirurgi inte är aktuellt

Prematurfödda: 2 mg/kg x 2
Nyfödda samt barn under 2 mån: 1,5 mg/kg x 2
Barn 2 mån - 18 år: 1 mg/kg x 2

Dosjustera för att uppnå ett värde (antiFXa) mellan 0,5 - 1 hämmarenheter (erhålls vanligen 4 - 6 timmar efter injektion). Observera att det kan ta flera dygn att uppnå målspannet (0,5 - 1 hämmarenheter).

RIMLIG DOS FÖR 10 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,5 mg/kg	-	0,25 mL	0,5 mL	2,5 mL
0,75 mg/kg	0,08 mL	0,38 mL	-	-
1 mg/kg	-	0,5 mL	1 mL	5 mL
1,5 mg/kg	-	0,75 mL	-	-
2 mg/kg	0,2 mL	-	-	-

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Micromedex

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation (Grade 2C)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1359

Enoxaparinnatrium subkutan inj 10 mg/mL

(Klexane)



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2018-08-30
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-08-30
Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

ePedID: 1359
Versionsnummer, major: 2
Giltig fr o m: 2018-08-29

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT