

KETANEST-S 0,5 mg/ml, IV inj, IV inf

s-ketamin 0,5 mg/ml

enl spädn-instruktion

OBS Flera styrkor finns. Kontrollera att rätt instruktion används.

<i>inj lös</i>			<i>IV inj, IV inf</i>
25 mg/ml		glukos 50 mg/ml	0,5 mg/ml
1 ml	+	49 ml	= 50 ml

Administrering: 2-3 min intermittenta inj alt kontin inf med obs av BT och hjärtfrekv

Hållbarhet efter iordningställande: 12 tim i rt

Hållbarhet originalförp: se förpackning

Varunummer: 641688, Ketanest-S licens,

Källa: Licens

Indikation: Smärta

Vanlig dos: Inj vid procedurer: 0,1-0,5mg/kg.

Inj inför och under större ingrepp: 1-2-(3) mg/kg.

Inf 0,05 mg/kg/tim

Vanlig dos	Vanlig dos omräknad till volym beroende på kroppsvikt för s-ketamin 0,5 mg/ml			
	0,5 kg	1 kg	2 kg	3 kg
INF 0,05 mg/kg/tim	0,05 ml/tim	0,10 ml/tim	0,20 ml/tim	0,30 ml/tim
INJ 0,1 mg/kg	0,10 ml	0,20 ml	0,40 ml	0,60 ml
INJ 2 mg/kg	2,00 ml	4,00 ml	8,00 ml	12,00 ml