

Kalcium 7 mg Ca/ml oral lösning

Ingen spädningsinstruktion

Administreringsätt

Oralt: Ska ej ges tillsammans med oralt fosfat.

Enteralt i sond: Går att ge i sond. Kalcium kan binda till fosfat i mat, därför bör tuben spolas noggrant så att kalcium inte kommer i kontakt med maten för att minska risken för ocklusion i sond.

Vanlig indikation

Neo: Rakitprofylax

Vanlig dosering

14 mg/kg x 2 = 2 ml/kg x 2

Rimlig dos för barn

14 mg/kg

1 kg

2 ml

5 kg

10 ml

10 kg

50 kg

Substans

Calcium lactate, A12AA05

Referens/Länk

ATL Barn 2004 - Extemporeläkemedel i Sverige till Barn

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2013-11-13 21:11:47

Fastställare/läkare: Lars Naver 2013-11-15 08:19:05

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 1364

ID/spårnummer: 187

Giltig fr o m: 2013-11-15 08:19:05

Utskriftsdatum: 2013-11-15

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

