

# Impugan 10 mg/ml oral lösning

## Ingen spädninginstruktion

---

### Hållbarhet och beredningsform

Impugan (Registrerad Produkt)

- 10 mg/mL, Orala droppar, lösning, Hållbar: Inga särskilda förvaringsanvisningar. Vid höga hygienkrav hållbar 1 mån efter första uttag, annars 6 mån.

---

### Administreringsätt

Oralt: Impugan kan blandas i vatten, ljummet te och i kall mjölk. Sura lösningar såsom juice och saft skall undvikas på grund av risk för utfällning.

Enteralt i sond: Går att ges i sond.

---

### Vanlig indikation

Neo:

- 1) BPD, ödem
- 2) hjärtsvikt, njursvikt

### Vanlig dosering

Neo:

- 1) 1-2 mg/kg x 1-2\*
  - 2) 1-4 mg/kg x 1-2\* (ev. 5 mg/kg som engångdos).
- \*För barn med GA under 31 v ges furosemid x1.

---

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
1 mg/kg/dos	0,1 ml	0,5 ml		
2 mg/kg/dos	0,2 ml	1 ml		

---

### Substans

Furosemide, C03CA01

---

### Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/PHP.htm>

Neonatal Formulary

Ped Dosage Handbook, Taketomo, <http://www.lexi.com>

[http://online.lexi.com/crsql/servlet/crlonline?a=doc&bc=pdh\\_f&mn=&id=](http://online.lexi.com/crsql/servlet/crlonline?a=doc&bc=pdh_f&mn=&id=)

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2013-11-06 14:18:20

Fastställare/läkare: Lars Naver 2013-11-15 07:17:12

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 1370

ID/spårnummer: 174

Giltig fr o m: 2013-11-15 07:17:12

Utskriftsdatum: 2013-11-15

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

