

Furosemid oralt 10 mg/mL

(Impugan) orala droppar

Överväg kaliumsparande diuretika alternativt kaliumsubstitution som tilläggsbehandling.

Administreringsätt

Oralt: Dropparna kan blandas i vatten, ljummet te och i kall mjölk. Sura lösningar såsom juice och saft skall undvikas på grund av risk för utfällning.

Enteralt i sond

Vanlig indikation och dos

Högre doser kan krävas vid lägre GFR och/eller uttalad proteinuri

Urindrivande, ex vid bronkopulmonell dysplasi (BPD), hypertoni mm

Gäller även vid hjärtsvikt, njursvikt, hypertoni hos njurtransplanterade patienter samt som profylax vid volymbelastning av t.ex blodprodukt.

Nyfödda (prematurfödda): 1 - 2 mg/kg x 1

Nyfödda (fullgångna): 1 - 2 mg/kg x 1 - 2

Barn över 1 mån: 0,5 - 2 (- 3) mg/kg x 1 - 4

Stor variation i total dygnsdos:

Vanligen 1 - 4 mg/kg/dygn

Vid moderat hypertoni max 6 mg/kg/dygn

Max 12 mg/kg/dygn

Ödem, även vid nefrotiskt syndrom utan hypovolemi

Nyfödda (prematurfödda): 0,5 - 2 mg/kg x 1

Nyfödda (fullgångna): 0,5 - 2 mg/kg x 2

Barn över 1 mån: 0,5 - 2 (- 4) mg/kg x (1 -) 2 - 4

Stor variation i maxdos och total dygnsdos:

Max 6 mg/kg/dos, max 12 mg/kg/dygn

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-12-11 13:18:19

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-12-22 10:33:36

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sl.se

Läkemedelsnummer: 1370

ID/spårnummer: 4139

Giltig fr o m: 2017-12-22 10:33:36

Utskriftsdatum: 2018-01-11

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Furosemid oralt 10 mg/mL

(Impugan) orala droppar

Oligouri

Barn över 12 år: Initialt 250 mg x 1. Kan ökas till 250 mg x 4 - 6. Max 2 g/dos.

| Rimlig dos för barn | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 50 kg |
|---------------------|---------|---------|--------|--------|
| 0,5 mg/kg | 0,05 mL | 0,25 mL | 0,5 mL | 2,5 mL |
| 2 mg/kg | 0,2 mL | 1 mL | 2 mL | 10 mL |
| 3 mg/kg | | | | 15 mL |
| 6 mg/kg | | 3 mL | 6 mL | 30 mL |

Hållbarhet preparat:

Furosemid (ex Impugan) (registrerad produkt)

10 mg/mL, Orala droppar, lösning

Hållbar: Inga särskilda förvaringsanvisningar. Vid höga hygienkrav hållbar 1 mån efter första uttag, annars 6 mån.

Övrig information

Samtidig användning med aminoglykosider kan ge en additiv oto- och/eller nefrotoxicitet.

Furosemid hämmar den tubulära sekretionen av metotrexat.

Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Internetadress Barnläkarföreningen - Hypertoni hos barn

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/varldprogram/>

Internetadress Svensk barnnefrologisk Förening, Nefrotiskt syndrom

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/varldprogram/>

NeoFax

Neonatal Formulary

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 1B)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe_cfm?show=grade

Lokal länk

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-12-11 13:18:19

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-12-22 10:33:36

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sl.se

Läkemedelsnummer: 1370

ID/spårnummer: 4139

Giltig fr o m: 2017-12-22 10:33:36

Utskriftsdatum: 2018-01-11

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Furosemid oralt 10 mg/mL

(Impugan) orala droppar

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1370

Substansspecifika uppgifter

Furosemide, C03CA01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceid=IDE4POBTU90VUVERT1&UserTypeId=0>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-12-11 13:18:19

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-12-22 10:33:36

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1370

ID/spårnummer: 4139

Giltig fr o m: 2017-12-22 10:33:36

Utskriftsdatum: 2018-01-11

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

