



Naturliga fosfolipider intratrakealt 80 mg/mL

(Curosurf)

Monitorera kontinuerligt hjärtfrekvens och arteriell syrgaskoncentration eller syrgasmättnad.

INGEN SPÄDNING

INSTVÄ SUSP
80 mg/mL
1,5 mL alt 3 mL

ADMINISTRERING

IntraTRACHealt: ges via endotrakealtub

Injektionsflaskan bör värmas till rumstemperatur före användning, t.ex. genom att hålla den i handen några minuter.

Vänd flaskan försiktigt upp och ner några gånger. Skaka inte, det kan orsaka skumbildning.

Rensugning av luftvägarna ska undvikas 4 – 6 timmar efter administrering av Curosurf.

Biologiskt läkemedel. Enligt författning HSLF-FS 2017:37 ange batchnummer i journalhandling.

RIMLIG DOS för Naturliga fosfolipider intratrakealt 80 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
100 mg/kg	1,25 mL	6,25 mL	-	-
200 mg/kg	2,5 mL	12,5 mL	-	-

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Curosurf (registrerad produkt)

80 mg/mL, Instillationsvätska för luftvägarna, suspension

Förvaras i kylskåp i originalförpackning, ljuskänsligt.

Flaska som värmts upp till rumstemp en gång kan återföras till kylskåp inom 24 tim, endast om den är öppen. En flaska ska inte återföras till kylskåp mer än en gång. För hantering, se Övrig info.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

För optimal effekt av behandlingen bör grav acidosis, hypoglykemi, hypotension, grav anemi och/eller hypotermi korrigeras.

Behandling av RDS (respiratory distress syndrome)

Nyfödda: 100 – 200 mg/kg

Vid fullt utvecklad RDS rekommenderas 200 mg/kg.

En andra och eventuellt tredje dos, vanligen 100 mg/kg, kan ges efter individuell bedömning. Doserna ges med (6 -) 12 timmars intervall.

Max totaldos 300 - 400 mg/kg.

Rensugning av luftvägarna ska undvikas 4 – 6 timmar efter administrering av Curosurf.

ÖVRIG INFORMATION

Förslag på hantering vid återförande av oanvänd injektionsflaska till kylskåp:

Markering kan ske med ett tydligt kryss på originalförpackningen tillsammans med en signatur. Injektionsflaska med kryss på ska inte återföras till kylskåp och bör förvaras åtskild från andra flaskor med Curosurf.

Den aktiva substansen i Curosurf kan även benämnas porcina lunglipider och protein, på engelska poractant alfa.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress VGR, Alfresco - Surfaktantbehandling (Curosurf) - neonatalvård

[https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/SKAS9699-1702881381-133/SURROGATE/Surfaktantbehandling%20\(Curosurf\)%20-%20neonatalv%20c3%a5rd.pdf](https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/SKAS9699-1702881381-133/SURROGATE/Surfaktantbehandling%20(Curosurf)%20-%20neonatalv%20c3%a5rd.pdf)

Rekommendation , (Grade 2A)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade



Naturliga fosfolipider intratrakealt 80 mg/mL (Curosurf)



LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1377

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 1377

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2023-04-11

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT