

cefOTAXim intravenös inj 100 mg/mL (ex Claforan)

En-stegsspädning:	Claforan/Cefotaxim		Sterilt Vatten		INJ
	0,5 g	+		=	100 mg/mL
	1 st		5 mL		5 mL

Beredningsinstruktion: Pulvret löses upp i lösningsmedlet genom att injektionsflaskan skakas kraftigt i minst 30 sekunder för att säkerställa att all substans lösts upp. Endast klara lösningar, fria från partiklar, ska användas.

En-stegsspädning:	Claforan/Cefotaxim		Sterilt Vatten		INJ
	1 g	+		=	100 mg/mL
	1 st		10 mL		10 mL

En-stegsspädning:	Claforan/Cefotaxim		Sterilt Vatten		INJ
	2 g	+		=	100 mg/mL
	1 st		20 mL		20 mL

Beredningsinstruktion: Obs! att 10 ml resp 20 ml inte får plats i 1 g resp. 2 g-flaskan. Lösningen beredes därför genom att ungefär hälften av det sterila vattnet först tillsättes till flaskan. När pulvret är upplöst dras de tillbaka till resten av vattnet i sprutan och blandas där till en homogen lösning.

Arbetsmiljö Allergirisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner, Cefalosporiner kan vid inandning och hudkontakt ge allergiska reaktioner

Administreringsätt

Intravenös injektion (3 - 5 min): Neo: 3 - 5 min inj alt. 30 min inf

Barn: Dosen ges långsamt under 3 - 5 minuter, antingen direkt i venen eller vid pågående infusion via en flervägskran.

Vanlig indikation och dos

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2016-09-09 09:01:02
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-09-09 10:10:28
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 1379
ID/spårnummer: 1466
Giltig fr o m: 2016-09-09 10:10:28
Utskriftsdatum: 2016-09-09

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



cefOTAXim intravenös inj 100 mg/mL (ex Claforan)

Systemisk bakteriell infektion, inklusive etmoidit

Prematurer samt barn under 1 vecka: 50 mg/kg x 2
Barn 8 dagar - 1 månad: 50 mg/kg x 3

1 mån - 18 år: 50 mg/kg x 2 - 3, max 3 g x 4

Meningit

Prematurer samt barn under 1 vecka: 50 mg/kg x 2
Barn 8 dagar - 1 månad: 50 mg/kg x 3

1 mån - 18 år: 75 mg/kg x 3 - 4, max 3 g x 4

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
50 mg/kg	0,5 mL	2,5 mL	5 mL	25 mL
75 mg/kg		3,8 mL	7,5 mL	37,5 mL

Hållbarhet preparat:

Claforan/Cefotaxim (Registrerad Produkt)

● 100 mg/mL, INJEKTIONSVÄTSKA

Hållbar: 12 tim i rumstemperatur, 24 tim i kyl

Övrig information

Nyberedd injektionslösning kan ändra färg till svagt ljusgul. Lösningar med starkt gul eller brunaktig färg skall ej användas.

Förvaras i ytterkartongen, ljuskänsligt.

Cefotaxim kan även spädas med följande lösningar:
Natriumklorid 9 mg/ml (0,9%), Glukos 50 mg/ml (5%).

Referens/Länk

Egen tolkning Använt hållbarhetsdata för Claforan ihop med Trissel för vår hållbarhet, Hämtat: 2012-09-15

FASS, Hämtat: 2015-09-09

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Etmoidit, Hämtat: 2015-09-09

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vvWebbLookup/ID1F6F5E13103DE495C1257A2900419A33>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus PM, Bakteriell meningit, Hämtat: 2015-09-09

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vvWebbLookup/ID3EBEAB4E8F417602C1257A290044A04F?OpenDocument>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2016-09-09 09:01:02

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-09-09 10:10:28

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 1379

ID/spårnummer: 1466

Giltig fr o m: 2016-09-09 10:10:28

Utskriftsdatum: 2016-09-09

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



cefOTAXim intravenös inj 100 mg/mL (ex Claforan)

Rekommendation ,(Grade 1B), Hämtat: 2015-09-11

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show-grade

Trissel Book on Injectable Drugs , Hämtat: 2015-09-09

Substansspecifika uppgifter

Cefotaxim, J01DD01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POF9UATSTVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2016-09-09 09:01:02
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-09-09 10:10:28
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 1379
ID/spårnummer: 1466
Giltig fr o m: 2016-09-09 10:10:28
Utskriftsdatum: 2016-09-09

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

