



Kloramfenikol konjunktivalt 10 mg/g = 1 %

ögonsalva

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kloramfenikol Santen ögonsalva 10 mg/g

ADMINISTRERINGSSÄTT

I nedre konjunktival-säcken:

Ta bort eventuellt sekret i ögat före administreringen. Se till att tuben inte kommer i kontakt med ögat vid administreringen, bakterier kan överföras till tuben.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Kloramfenikol (registrerad produkt)

1 %, Ögonsalva

HÅLLBAR: Öppnad tub: förvaras i kylskåp. Får ej frysas. Öppnad tub: i rumstemperatur hållbar 7 dagar om användning till flera patienter, 28 dagar om användning till enskild patient.

ÖVRIG INFORMATION

Kontaktlinser ska inte användas i infekterade ögon.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Bakteriell ögoninfektion, förebyggande av infektion efter skada, operation eller borttagande av främmande kropp

Nyfödda: 1 cm salva x 4 - 8

Barn 1 mån - 18 år: 1 cm salva x 4 - 8

Doseringen beror på typ av infektion och svårighetsgrad. Inledningsvis används den högre doseringsfrekvensen, när symtomen lindrats kan frekvensen minskas. Behandlingen ska pågå till 2 dygn efter symtomfrihet.

Behandlingstid: högst 10 - 14 dagar

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2018-03-12

ePedID: 1380

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-03-12

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-03-12

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT