



Levobupivakain 0,625 mg/mL

(Chirocaine) flera administreringsätt

Får INTE ges intravenöst.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Beredningsinstruktion:

Bruksfärdig levobupivakain 0,625 mg/mL.

Kan spädas vidare med NaCl 9 mg/mL.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Epidural infusion (EDA): kontinuerlig infusion

Perifer nervblockad

Sårkateter infusion

Nyfödda: Kontinuerlig infusion alt. intermittent långsam injektion i sårkateter.

RIMLIG DOS FÖR 0,625 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,2 mg/kg/tim	0,32 mL/tim	1,6 mL/tim	3,2 mL/tim	16 mL/tim
0,3 mg/kg/tim	0,48 mL/tim	2,4 mL/tim	4,8 mL/tim	24 mL/tim
0,5 mg/kg/tim	0,8 mL/tim	4 mL/tim	8 mL/tim	40 mL/tim

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Levobupivakain (registrerad produkt)

0,625 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Öppnad förpackning: får ej sparas, används direkt. Färdigspädd lösning: 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Postoperativ smärtlindring

Kontinuerlig infusion

Nyfödda (prematura och fullgångna nyfödda): MAX 0,2 - 0,25 mg/kg/tim

Barn 1 mån - 18 år: MAX 0,3 - 0,5 mg/kg/tim

Smärtbehandling med lokalanestetika

Barn 1 mån- 18 år: 1,25 - 2 mg/kg som engångsdos, max 2 mg/kg

REFERENS/LÄNK

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2018-10-31

ePedID: 1382

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-01-23

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-01-23

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT