



Levobupivakain 0,625 mg/mL

spädning från Chirocaine 2,5 mg/mL, flera administreringsätt

Får INTE ges intravenöst.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Alt. 1: Injektionslösning 0,625 mg/mL (Chirocain, tillhandshålls ej)

Alt. 2: Spädning från injektionslösning 2,5 mg/mL (Chirocain)

INGEN SPÄDNING

Alt. 1

INF
0,625 mg/mL
100 mL

Beredningsinstruktion:

Kan spädas vidare med NaCl 9 mg/mL

EN-STEGSSPÄDNING

Alt. 2

Levobupivakain		NaCl 9 mg/mL		INF
2,5 mg/mL				0,625 mg/mL
5 mL	+	15 mL	=	20 mL

ADMINISTRERING

Epidural infusion (EDA): kontinuerlig infusion

Perifer nervblockad

Sårkateter infusion

Nyfödda: Kontinuerlig infusion alt. intermittent långsam injektion i sårkateter.

RIMLIG DOS för Levobupivakain 0,625 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,2 mg/kg/tim	0,32 mL/tim	1,6 mL/tim	3,2 mL/tim	16 mL/tim
0,3 mg/kg/tim	0,48 mL/tim	2,4 mL/tim	4,8 mL/tim	24 mL/tim
0,5 mg/kg/tim	0,8 mL/tim	4 mL/tim	8 mL/tim	40 mL/tim

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Postoperativ smärtlindring

Kontinuerlig infusion

Nyfödda (prematura och fullgångna nyfödda): max 0,2 - 0,25 mg/kg/tim

Barn 1 mån - 18 år: max 0,3 - 0,5 mg/kg/tim

Smärtbehandling med lokalanestetika

Barn 1 mån - 18 år: 1,25 - 2 mg/kg som engångsdos, max 2 mg/kg

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress ePed - Hållbarhetsinformation

<http://eped.se/hallbarhet/>

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens

Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Tamara Alani

ePedID: 1382

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2023-03-21

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT





Levobupivakain 0,625 mg/mL

spädning från Chirocaine 2,5 mg/mL, flera administreringsätt

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Levobupivakain (från registrerad produkt)

2,5 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

Bruten förpackning: får ej sparas, används direkt

0,625 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

Efter iordningställande: hållbar 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur.

Alternativt kan infusion pågå 24 tim efter iordningställande om bedömning eller utvärdering utförts enligt Svensk läkemedelsstandard, se referens

Hållbarhetsinformation.