

## Läkemedel för injektion eller infusion

CEPROTIN, IV inj  
protein C 100 E/ml  
enl spädn-instruktion

<i>inj subst</i>			<i>IV inj</i>
500 E		medföljande vätska	100 E/ml
pulver	+	5 ml	= 5 ml

---

Beredningsinstruktion: Följ instruktion på bipacksedel

Administrering: Max 0,2 ml/kg/min

Hållbarhet efter iordningställande: Resterande lösning får ej sparas

Hållbarhet originalförp: Förvaras i kyl. Får ej frysas. Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Källa: FASS

Obs: Ursprung i blodprodukt, hanteras enligt neo läkemedelshanteringsriktlinjer

---

Indikation: Koagulationsrubbing

Vanlig dos: Ordineras av koagulationsjour! (Vid purpura fulminans pga homozygot protein C- brist, 60-80 E/kg som alternativ till FFP)

---

Vanlig dos	Vanlig dos omräknad till volym beroende på kroppsvikt för protein C 100 E/ml			
	0,5 kg	1 kg	2 kg	3 kg
60 E/kg	0,30 ml	0,60 ml	1,20 ml	1,80 ml
80 E/kg	0,40 ml	0,80 ml	1,60 ml	2,40 ml

---