

Protein C intravenös inj 100 E/mL (Ceprotin)

Ordineras i samråd med barnkoagulationsmottagning/koagulationsjour.

En-stegsspädning:	Ceprotin		Medföljande vätska	=	INJ
	500 E	+	5 mL		100 E/mL 5 mL
En-stegsspädning:	Ceprotin		Medföljande vätska	=	INJ
	1000 E	+	10 mL		100 E/mL 10 mL

Beredningsinstruktion: Ska iordningsställas med den vätska (5 mL eller 10 mL) och de material som medföljer förpackningen. Slutkoncentration 100 E/mL. Följ instruktionen i bipacksedeln.

Rotera injektionsflaskan försiktigt vid upplösning av pulvret. Skaka inte, eftersom det kan leda till skumbildning.

Efter beredning ska lösningen vara klar och färglös. Använd den inte om den är grumlig.

Arbetsmiljö Biologiskt läkemedel, hantera enligt lokal instruktion, -

Administreringssätt

Intravenös injektion:
Barn under 10 kg: Max 0,2 mL/kg/min.
Barn över 10 kg: Max 2 mL/min.

Vanlig indikation och dos

Purpura fulminans (svår protein C-brist) - Akut behandling

Vanlig dos: 60 - 120 E/kg

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-06-15 08:39:18
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-12-05 11:48:14
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1383
ID/spårnummer: 4010
Giltig fr o m: 2017-12-05 11:48:14
Utskriftsdatum: 2017-12-05

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Protein C intravenös inj 100 E/mL (Ceprotin)

Profylaxbehandling vid medfödd protein C-brist

Vanlig dos: 45 - 60 E/kg

Dos baseras på individuellt behandlingssvar.
Kan även ges som subkutan infusion enligt lokal riktlinje på barnkoagulationsmottagning.

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
45 E/kg	0,45 mL	2,25 mL	4,5 mL	22,5 mL
60 E/kg	0,6 mL	3 mL	6 mL	30 mL

Hållbarhet preparat:

Ceprotin (registrerad produkt)

- 1 Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Hållbar: Förvaras i kylskåp (2 - 8 °C). Får ej frysas. Förvaras i ytterkartongen.
Ljuskänsligt.

- 100 E/mL, INJEKTIONSVÄTSKA

Hållbar: Får ej sparas, används direkt

Övrig information

Följ koagulationsparametrar regelbundet pga stor individuell variation av behandlingssvar.

Halveringstiden för protein C kan vara förkortad vid vissa kliniska tillstånd som t.ex. akut trombos.

Referens/Länk

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Svenska sällskapet för trombos och hemostas (SSTH)

<http://www.ssth.se/>

Rekommendation (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

protein c, B01AD12

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceid=IDE4POIEUCE2IVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-06-15 08:39:18

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-12-05 11:48:14

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sl.se

Läkemedelsnummer: 1383

ID/spårnummer: 4010

Giltig fr o m: 2017-12-05 11:48:14

Utskriftsdatum: 2017-12-05

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

