

CARNITOR, IV inj, IV inf

levokarnitin 50 mg/ml

enl spädn-instruktion

| | | | |
|----------------|---|--------------|-----------------------|
| <i>inj lös</i> | | | <i>IV inj, IV inf</i> |
| 200 mg/ml | | NaCl 9 mg/ml | 50 mg/ml |
| 2,5 ml | + | 7,5 ml | = 10 ml |

Administrering: 2-3 min intermittent inj alt kontin inf

Hållbarhet efter iordningställande: 12 h rumstemperatur

Hållbarhet originalförp: Resterande lösning får ej sparas

Varunummer: 784868, Carnitor injvä 200mg/ml, 5 x 5 ml

Källa: Licens

Indikation: Metabol defekt i fettsyra- eller aminosyrametabolismen

Vanlig dos: Ordineras av spec i metab sjuk! 200 mg/kg/d (kontin inf eller inj x 4)

| Vanlig dos | Vanlig dos omräknad till volym beroende på kroppsvikt för levokarnitin 50 mg/ml | | | |
|----------------|---|--------------|--------------|---------------|
| | 0,5 kg | 1 kg | 2 kg | 3 kg |
| 200 mg/kg/dygn | 2,00 ml/dygn | 4,00 ml/dygn | 8,00 ml/dygn | 12,00 ml/dygn |
