



## Acetylcystein rektalt 100 mg/mL

Acetylcystein lösning för nebulisator används för rektalt bruk.

### EN-STEGSSPÄDNING

Acetylcystein		NaCl 9 mg/mL		REKTALLÖSN
200 mg/mL				100 mg/mL
5 mL	+	5 mL	=	10 mL

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Rektalt:  
Vätskan bör vara kroppsvarm vid administrering.

### RIMLIG DOS för Acetylcystein rektalt 100 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
2 mL/kg	2 mL	10 mL	-	-
5 mL/kg	5 mL	25 mL	-	-

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Acetylcystein (registrerad produkt)

200 mg/mL, Lösning för nebulisator

HÅLLBAR: Öppnad injektionsflaska förvaras i rumstemperatur. Öppnad flaska hållbar 4 veckor vid förvaring i kylskåp.

100 mg/mL, Rektallösning

HÅLLBAR: Får ej sparas, används direkt.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

**Obstipation hos prematurfödda barn (låg evidens, erfarenhetsbaserad behandling)**

Nyfödda: 2 - 5 mL/kg x 1 - 3

### REFERENS/LÄNK

#### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#1392](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1392)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2020-09-18

ePedID: 1392

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-10-06

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2020-10-06

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**