

Flukloxacillin oralt 50 mg/mL

(Heracillin)

Arbetsmiljö

Allergirisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner, Penicilliner kan ge allergi vid inandning, hudkontakt och förtäring. Långvarig eller upprepad inandning eller hudkontakt kan ge allergiska reaktioner

Administreringsätt

Oralt: Flukloxacillin har bäst effekt om doserna tas mellan måltider (minst 30 minuter före måltid).

Enteralt i sond: Suspensionen kan behöva spädas med samma volym vatten för att minska osmolariteten.

Vanlig indikation och dos

Bakteriell infektion med bakterier känsliga för flukloxacillin, fr.a. infektioner i lungor, hud och/eller mjukdelar

Nyfödda:

Dag 0 - 7: 25 mg/kg x 2

Dag 8 - 21: 25 mg/kg x 3

Dag 22 - 28: 25 mg/kg x 4

Barn 1 mån - 18 år: 10 - 17 mg/kg x 3

Barn över 2 år: dosen kan ökas till 20 - 33 mg/kg x 3, max 1 g x 3, vid infektioner i leder och skelett samt vid allvarliga infektioner i lungor, hud eller mjukdelar.

Uppföljande peroral behandling av skelettinfektioner så som osteomyelit, septisk artrit, spondylodiskit orsakade av Staphylococcus aureus

Barn 1 mån - 18 år: 25 mg/kg x 4, max 4 (- 6) g/dygn

Total rekommenderad behandlingstid, inkl. inledande intravenös behandling, i okomplicerade fall: 4 veckor

Luftvägsinfektion vid Cystisk fibros

Barn 1 mån - 18 år: 25 mg/kg x 4 alt 33 mg/kg x 3, max 4,5 g/dygn

Rimlig dos för barn

1 kg**5 kg****10 kg****50 kg**

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-03-09 09:02:27

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-03-16 10:08:06

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1398

ID/spårnummer: 2993

Giltig fr o m: 2017-03-16 10:08:06

Utskriftsdatum: 2017-03-16

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Flukloxacillin oralt 50 mg/mL (Heracillin)

| Rimlig dos för barn | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 50 kg |
|---------------------|--------|--------|--------|-------|
| 17 mg/kg | | 1,7 mL | 3,4 mL | 17 mL |
| 25 mg/kg | 0,5 mL | 2,5 mL | 5 mL | 25 mL |
| 33 mg/kg | | 3,3 mL | 6,6 mL | 33 mL |

Hållbarhet preparat:

Flukloxacillin (ex Heracillin) (registrerad produkt)

50 mg/mL, Oral lösning

Hållbar: Beställs färdigberedd från Apoteket som oral suspension och är hållbar 14 dygn vid förvaring i kylskåp.

Övrig information

Många upplever att suspensionen med flukloxacillin smakar illa.

Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/htm>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation ,(Grade 1B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show-grade

Lokal länk

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjonet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1398

Substansspecifika uppgifter

Flucloxacillin, J01CF05

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POE1U9VI9VVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-03-09 09:02:27
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-03-16 10:08:06
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1398
ID/spårnummer: 2993
Giltig fr o m: 2017-03-16 10:08:06
Utskriftsdatum: 2017-03-16

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

