

# Flukloxacillin oralt 50 mg/mL

## (Heracillin) oral suspension

---

**Arbetsmiljö** Allergirisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner, Penicilliner kan ge allergi vid inandning, hudkontakt och förtäring. Långvarig eller upprepad inandning eller hudkontakt kan ge allergiska reaktioner

---

**Administreringsätt**

Oralt: Flukloxacillin har bäst effekt om doserna tas mellan måltider (minst 30 minuter före måltid).

Enteralt i sond: Suspensionen kan behöva spädas med samma volym vatten för att minska osmolariteten.

---

### Vanlig indikation och dos

**Bakteriell infektion med bakterier känsliga för flukloxacillin, fr.a. infektioner i lungor, hud och/eller mjukdelar**

Nyfödda:

Dag 0 - 7: 25 mg/kg x 2

Dag 8 - 21: 25 mg/kg x 3

Dag 22 - 28: 25 mg/kg x 4

Barn 1 mån - 18 år: 10 - 17 mg/kg x 3

Barn över 2 år: dosen kan ökas till 20 - 33 mg/kg x 3, max 1 g x 3, vid infektioner i leder och skelett samt vid allvarliga infektioner i lungor, hud eller mjukdelar.

**Uppföljande peroral behandling av skeletinfektioner så som osteomyelit, septisk artrit, spondylodiskit orsakade av Staphylococcus aureus**

Barn 1 mån - 18 år: 25 mg/kg x 4, max 4 (- 6) g/dygn

Total rekommenderad behandlingstid, inkl. inledande intravenös behandling, i okomplicerade fall: 4 veckor

**Luftvägsinfektion vid Cystisk fibros**

Barn 1 mån - 18 år: 25 mg/kg x 4 alt 33 mg/kg x 3, max 4,5 g/dygn

---

### Rimlig dos för barn

1 kg

5 kg

10 kg

50 kg

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-03-20 15:50:52

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-03-21 13:10:59

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sl.se

Läkemedelsnummer: 1398

ID/spårnummer: 3003

Giltig fr o m: 2017-03-21 13:10:59

Utskriftsdatum: 2017-03-21

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



# Flukloxacillin oralt 50 mg/mL

## (Heracillin) oral suspension

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
17 mg/kg		1,7 mL	3,4 mL	17 mL
25 mg/kg	0,5 mL	2,5 mL	5 mL	25 mL
33 mg/kg		3,3 mL	6,6 mL	
max 1,5 g				30 mL

**Hållbarhet preparat:**

Flukloxacillin (ex Heracillin) (registrerad produkt)

 50 mg/mL, Oral lösning

Hållbar: Beställs färdigberedd från Apoteket som oral suspension och är hållbar 14 dygn vid förvaring i kylskåp.

**Övrig information**

Många upplever att suspensionen med flukloxacillin smakar illa.

**Referens/Länk**

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnf/current/htm>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation ,(Grade 1B)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)**Lokal länk**

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjonet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#1398](http://eped.sll.sjonet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1398)**Substansspecifika uppgifter**

Flucloxacillin, J01CF05

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceId=ID4POE1U9V19VERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2017-03-20 15:50:52  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-03-21 13:10:59  
Källa: www.eped.se  
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1398  
ID/spårnummer: 3003  
Giltig fr o m: 2017-03-21 13:10:59  
Utskriftsdatum: 2017-03-21

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

