



Neostigmin oralt 150 mikrog/mL

Injektionsvätska för oralt bruk.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Spädning av injektionsvätska 2,5 mg/mL för ORALT bruk

EN-STEGSSPÄDNING

Neostigmin	Vatten*		ORAL LÖSN
2,5 mg/mL			150 mikrog/mL
1 mL	+	15,5 mL	= 16,5 mL

Beredningsinstruktion:

*Sterilt vatten kan vara lämpligt för infektiökänsliga barn, till övriga patienter går kranvatten bra.

Märk iordningställd lösning "för ORALT bruk" för att undvika förväxling.

ADMINISTRERING

Oralt

Enteralt

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Neostigmin (registrerad produkt)

2,5 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

Förvaras vid högst 25 °C.

150 mikrog/mL, Injektionsvätska, för oralt bruk

Får ej sparas, används direkt.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ordineras i samråd med barnneurolog.

Neonatal myastenia gravis

Nyfödda: 1 mg, ges 20 - 30 min före varje matning. (6,7 mL)

Justera dosen efter respons.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Rekommendation , (Grade 2B)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1399

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 1399

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2023-11-28

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT