



Neostigmin oralt 150 mikrog/mL

Injektionsvätska för ORALT bruk

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Spädning av injektionsvätska 2,5 mg/mL för ORALT bruk.

EN-STEGSSPÄDNING

Neostigmin 2,5 mg/mL 1 mL	+	Vatten (från kran) 15,5 mL	=	ORAL LÖSN 150 mikrog/mL 16,5 mL
---------------------------------	---	-----------------------------------	---	--

ADMINISTRERING

Oralt
Enteralt

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Neostigmin (registrerad produkt)

2,5 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C.

150 mikrog/mL, Oral lösning

HÅLLBAR: Får ej sparas, används direkt.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ordineras i samråd med barnneurolog.

Neonatal myastenia gravis

Nyfödda: 1 mg, ges 20 - 30 min före varje matning. (6,7 mL)

Justera dosen efter respons.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Rekommendation , (Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1399

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2021-09-24

ePedID: 1399

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-10-05

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2021-10-05

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT