

Läkemedel för injektion eller infusion

CEFTRIAXON STRAGEN+XYLOCAIN, IM inj

ceftriaxon (+lidocain) 250 mg/ml

enl spädn-instruktion

<i>inj subst</i>			<i>IM inj</i>
1000 mg		xylocain utan konserv-medel 10 mg/ml	250 mg/ml
pulver	+	3,5 ml	= 4 ml

Beredningsinstruktion: Obs! Använd Xylocain 10 mg/ml utan konserveringsmedel

Ceftriaxon ACS Dobutar Generics är synonympreparat till Ceftriaxon Stragen och kan användas om inte Ceftriaxon Stragen finns hemma.

Administrering: IM inj.

OBS

-Ges som inf över 60 minuter om doser över 50 mg/kg

-Ges som inf över 60 minuter eller avstå behandling med ceftriaxon om barnet har höga nivåer av okonjugerat bilirubin.

Med anledning av risk för utfällning:

För barn <28 levnadsdagar, vänta 48 tim före eller efter inf/inj med kalcium (gäller även vid separata infarter).

För barn >28 levnadsdagar spola ordentligt mellan varje infusion av kalcium och ceftriaxone.

Hållbarhet efter iordningställande: Resterande lösning får ej sparas

Hållbarhet originalförp: Ceftriaxon: Förvaras vid högst 25 C. Förvaras i originalförpackningen.

Ljuskänsligt.

Xylocain: Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas.

Varunummer: 25022, Ceftriaxon Stragen pu inj 1g, 10 x 1 g

Källa: FASS

Obs: Allergent läkemedel, hanteras enligt neo läkemedelshanteringsriktlinjer

Indikation: Systemisk bakteriell infektion och avsaknad av IV infart

Vanlig dos: 50-75 (-100) mg/kg x 1. Dos beroende av gestationsålder och postnatal ålder.

	Vanlig dos omräknad till volym beroende på kroppsvikt för ceftriaxon (+lidocain) 250 mg/ml			
Vanlig dos	0,5 kg	1 kg	2 kg	3 kg
50 mg/kg	0,10 ml	0,20 ml	0,40 ml	0,60 ml
100 mg/kg	0,20 ml	0,40 ml	0,80 ml	1,20 ml
