

AMBISOME, IV inf (Obs 2 steg)

amfotericin B 2 mg/ml

enl spädn-instruktion

OBS Flera styrkor finns. Kontrollera att rätt instruktion används.

	<i>inf lösn</i>			<i>stamlösning</i>
steg 1	50 mg		sterilt vatten	4 mg/ml
	pulver	+	12 ml	= 12 ml
	<i>stamlösning</i>			<i>IV inf</i>
steg 2	4 mg/ml		glukos 50 mg/ml	2 mg/ml
	10 ml	+	10 ml	= 20 ml

Beredningsinstruktion: Obs! Beställ helst apoteksberett Amfotericin B à 2 mg/ml 50 ml

Om egen beredning: Skaka OMEDELBART stamlösn. kraftigt i 30 sek. FILTRERA stamlösn genom det medföljande filtret. Använd ej lösningen ifall utfällning av främmande ämne iakttas.

Administrering: 1 tim

Hållbarhet efter iordningställande: Om iordningställande på avd: 12 tim i rt och 24 tim i kyl. Stamlösningen får pga risk för förväxling inte sparas. Bruten apoteksberedd förpackning hållbar 12 tim rt och 24 tim kyl om uttag sker med hjälp av infusions-set.

Hållbarhet originalförp: Om apoteksberett 3 dygn i rt, 7 dygn i kyl i obruten förpackning. Torrampullen förvaras vid högst 25 C. Får ej frysas.

Källa: FASS

Obs: Allergent läkemedel, hanteras enligt neo läkemedelshanteringsriktlinjer

Indikation: Svampsepsis

Vanlig dos: 5-7 mg/kg x 1

Vanlig dos	Vanlig dos omräknad till volym beroende på kroppsvikt för amfotericin B 2 mg/ml			
	0,5 kg	1 kg	2 kg	3 kg
5 mg/kg	1,25 ml	2,50 ml	5,00 ml	7,50 ml
7 mg/kg	1,75 ml	3,50 ml	7,00 ml	10,50 ml