

Klonidin IV inf 3 mikrog/mL APOTEKSBEREDD

Clonidine

OBS. Flera styrkor finns. Stor risk för förväxling, kontrollera styrkan noggrant.

En-stegsspädning:	Catapresan		Glukos 50 mg/mL		INJ-INF LÖ
	150 mikrog/mL	+		=	3 mikrog/mL
	1 mL		49 mL		50 mL

Beställ helst apoteksberedd klonidinhydroklorid, 3 mikrog/ml. Om beredning sker från Catapressan antecknas det vid administreringstillfället.

Hållbarhet preparat:

Klonidinhydroklorid (Registrerad Produkt)

- 3 mikrog/mL, Injektions-/infusionsvätska, lösning, Hållbar: Om apoteksberett i inj flaska: oöppnad 3 mån kyl. Efter första uttag 12 tim rumstemperatur alt 24 tim kyl. Om iordningställd på avd: 12 tim i rumstemperatur. Vid kontinuerlig infusion via filter 0,22 um kan inf pågå i 24 tim.

Administreringsätt

Intravenös kontinuerlig infusion (24 tim): 3-5 min intermittent injektion alternativt kontinuerlig infusion med observation av blodtryck och hjärtfrekvens

Vanlig indikation och dos

Neo: Smärta, hypertension

3-9 (-12) mikrog/kg/dygn, fördelat på 3-4 doser eller som kontin inf.

Rimlig dos för barn

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
INF 3 mikrog/kg/dygn	0,04 mL/tim	0,2 mL/tim		
INF 12 mikrog/kg/dyg	0,17 mL/tim	0,8 mL/tim		

Referens/Länk

FASS , Hämtat: 2014-11-12

<http://www.fass.se/LIF/substance76&userType=0&substancelid=>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Hämtat: 2014-11-12

<http://eped.se/referenser/>

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2014-11-12 14:28:10

Fastställare/läkare: Lars Naver 2014-11-18 10:17:20

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 1409

ID/spårnummer: 432

Giltig fr o m: 2014-11-18 10:17:20

Utskriftsdatum: 2015-06-22

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

