

**Rifadin 6 mg/ml IV inf (se spädn-instr)****Två-stegspädning till 6 mg/mL 100 mL**

Spädes från Rifadin 600 mg med medföljande vätska.

<b>steg1</b>	PULVER INF 600 mg 1 st	+	Medföljande vätska  1 st	=	Stamlösning 60 mg/mL 10,5 mL
<b>steg2</b>	Stamlösning 60 mg/mL 10 mL	+	Glukos 50 mg/ml  90 mL	=	IV <b>6 mg/mL</b> 100 mL

**Farmaceutiska uppgifter**

Rifadin (Registrerad Produkt)

6 mg/mL, Infusionsvätska, lösning, Hållbar: 6 tim i rt.

600 mg, Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning, Hållbar: Förvaras vid högst 25 °C.

60 mg/mL, Stamlösning, Hållbar: Stamlösningen får pga risk för förväxling inte sparas.

**Administreringsätt**

Infunderas intravenöst under 2-3 timmar.

Vid administrering av volymer mindre än 50 ml. Dra upp ordinerad volym i spruta innan läkemedlet kopplas till patient.

Rimlig dos i neonatalperioden	0,5 kg	1 kg	3 kg	5 kg
10 mg/kg/dos	0,83 ml	1,67 ml	5,00 ml	8,33 ml
5 mg/kg/dos	0,42 ml	0,83 ml	2,50 ml	4,17 ml

**Vanlig indikation och dosering**

Indikation: Systemisk infektion med multiresistenta staphylokokker (endast som del i kombinationsbehandling p.g.a. risk för resistensutveckling).

Dos: Neo-18 år: 5 - 10 mg/kg x 1 (-2). Maxdos 600 mg/dos, 1200 mg/dygn.

**Substansspecifika uppgifter**

Rifampicin, J04AB02

**Referens/Länk**

RNF-C Rifampicin

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2013-03-13 13:48:32

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2013-03-13 14:27:29

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Identifieringsnummer: 1416

Versionsnummer: 29

Giltig fr o m: 2013-03-13 14:27:29

Utskriftsdatum: 2013-03-13

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



## Rifadin 6 mg/ml IV inf (se spädn-instr)

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/PHP12862.htm>

Neonatal Formulary Rifampicin

FASS via fass.se Rifadin >12 år

[http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel\\_produktp.asp?NplID=19820205000098&DocTypeID=3&UserTypeID=0](http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produktp.asp?NplID=19820205000098&DocTypeID=3&UserTypeID=0)

Personlig kontakt Rifampicin, Niklas Pal.

Rekommendation Rifadin intravenöst 0-18 år ,(Grade 1B)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Teddy Bear Rifampicin

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2013-03-13 13:48:32  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2013-03-13 14:27:29  
Källa: www.eped.se  
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Identifieringsnummer: 1416  
Versionsnummer: 29  
Giltig fr o m: 2013-03-13 14:27:29  
Utskriftsdatum: 2013-03-13

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

