



# Rifampicin intravenös inf 6 mg/mL

(ex Rifadin)

**Rifampicin ska alltid kombineras med annat antibiotikum/tuberkulosläkemedel p.g.a snabb resistensutveckling.**

## TVÅ-STEGLÄKEMEDELSPÄDNING Alt. 1

<b>Steg 1</b> Rifampicin 600 mg 1 st	+ Medföljande vätska 10 mL	= Stamlösning 60 mg/mL 10,5 mL
<b>Steg 2</b> Stamlösning 60 mg/mL 5 mL	+ NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50 mg/mL 45 mL	= INF <b>6 mg/mL</b> 50 mL

## TVÅ-STEGLÄKEMEDELSPÄDNING Alt. 2

<b>Steg 1</b> Rifampicin 600 mg 1 st	+ Medföljande vätska 10 mL	= Stamlösning 60 mg/mL 10,5 mL
<b>Steg 2</b> Stamlösning 60 mg/mL 10 mL	+ NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50 mg/mL 90 mL	= INF <b>6 mg/mL</b> 100 mL

### Beredningsinstruktion:

Tillsätt medföljande spädningsvätska (sterilt vatten) till flaskan med pulvret och skaka kraftigt tills allt pulver har löst sig.

Infusionspåsar/flaskor i plast är överfyllda. Överfyllnadsvolymen skiljer sig mellan olika tillverkare och förpackningar. När man drar ut den volym spädningsvätska, som motsvarar volymen stamlösning som ska tillsättas, från en 100 mL påse/flaska blir koncentrationen rifampicin ca 5,3 - 6,0 mg/mL.

Då pulvret i sig bidrar med en viss volym ger upplösning med 10 mL steril vatten en stamlösning på 10,5 mL.

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

Rifampicin bör endast användas till infektioner med mykobakterier och svårare stafylokockinfektioner. Rifampicin ska alltid kombineras med annat antibiotikum/tuberkulosläkemedel p.g.a snabb resistensutveckling.

Bör ordinaras i samråd med infektions/lungläkare.

### Systemisk infektion med multiresistenta stafylokocker, biomaterialrelaterade KNS-infektioner inkl. shuntinfektion

I kombination med annat antibiotikum.

Nyfödda: 5 (- 10) mg/kg x 2

Barn 1 mån - 18 år:

5 - 10 mg/kg x 2 alt 10 - 20 mg/kg x 1, max 600 mg/dos, max 1200 mg/dygn

### Tuberkulös meningit

I kombination med andra tuberkulosläkemedel samt annat antibiotikum.

Nyfödda: 10 mg/kg x 1

Barn 1 mån - 18 år: 15 - 20 mg/kg x 1, max 600 mg/dos

Total behandlingstid, inkl. uppföljande peroral behandling: minst 6 mån

## ÖVRIG INFORMATION

Rifampicin är en potent inducerare av ett flertal CYP-enzymer bl.a. CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 och CYP3A4 vilket medför risk för interaktion med många andra läkemedel.

Leverenzym, bilirubin, kreatinin samt blodstatus inkl. blodkroppsräkning bör kontrolleras regelbundet.

Rifampicin rödfärgar urin och andra kroppsvätskor. Även mjuka kontaktlinser kan bli missfärgade.





# Rifampicin intravenös inf 6 mg/mL

(ex Rifadin)

## ARBETSMILJÖ

Allergirisk, hantera enligt lokal rutin, -

## ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös infusion: Ges under 30 min.

Vid större volymer än 100 mL bör infusionstiden ökas, t.ex. bör 500 mL ges under 3 timmar.

## RIMLIG DOS för Rifampicin intravenös inf 6 mg/mL

	<b>1 kg</b>	<b>5 kg</b>	<b>10 kg</b>	<b>50 kg</b>
5 mg/kg	0,83 mL	4,17 mL	8,33 mL	41,67 mL
15 mg/kg	-	12,5 mL	25 mL	-
20 mg/kg	-	16,67 mL	33,33 mL	-
max 600 mg	-	-	-	100 mL

## HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

### Rifampicin (registrerad produkt)

600 mg, Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C.

60 mg/mL, Stamlösning

HÅLLBAR: 12 tim i rumstemperatur, 24 tim i kyckåp. Stamlösningen bör INTE sparas pga förväxlingsrisk. Alternativt ska inte färdigspädd lösning sparas.

6 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: 6 tim i rumstemperatur om spädd med NaCl, 8 tim om spädd med glukos.

## REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Internetmedicin - Tuberkulos behandling 2017-06-07

<http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1767>

Internetadress RAF, Referensgruppen för antibiotikafrågor – Antibiotikakompendium

<https://www.sls.se/raf/lakemedel/antibiotikakompendium/>

Internetadress VGR, Alfresco - TB - Tuberkulos meningit

<https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/14950/?a=false&guest=true>

Micromedex

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 1B)

[http://www.essentialEvidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialEvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

## EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2019-06-04

ePedID: 1416

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-06-04

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2019-06-04

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT