

OCPLEX, IV inj  
protrombinkomplexkoncentrat 25 E/ml  
enl spädn-instruktion

<i>inj subst</i>			<i>IV inj</i>
500 E		medföljande vätska	25 E/ml
pulver	+	20 ml	= 20 ml

Beredningsinstruktion: Följ instruktion på bipacksedel

Administrering: 1 ml/min

Hållbarhet efter iordningställande: Resterande lösning får ej sparas

Hållbarhet originalförp: Förvaras vid högst 25 C i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Får ej frysas.

Varunummer: 20971, Ocpdex pulv o vätska t inj, 20 ml

Källa: FASS

Obs: Ursprung i blodprodukt, hanteras enligt neo läkemedelshanteringsriktlinjer

Indikation: Koagulationsrubbnig

Vanlig dos: Ordineras av koagulationsjour! 10-30 E/kg/dos med ledning av PK(INR)

Vanlig dos	Vanlig dos omräknad till volym beroende på kroppsvikt för protrombinkomplexkoncentrat 25 E/ml			
	0,5 kg	1 kg	2 kg	3 kg
10 E/kg/dos	0,20 ml	0,40 ml	0,80 ml	1,20 ml
30 E/kg/dos	0,60 ml	1,20 ml	2,40 ml	3,60 ml