

Protrombinkomplex intravenös inf/inj 25 E/mL (Confidex, Ocplex)

Bör ordineras i samråd med barnkoagulationsmottagning/koagulationsjour. Kontakta dem vid eventuella frågor.

Instruktionen gäller för: Confidex 25 E/mL (500 E och 1000 E)
Ocplex 25 E/mL (500 E och 1000 E)

OBS! Produkterna är ej utbytbara.

En-stegsspädning:	Ocplex/Confidex		Medföljande vätska		INJ-INF LÖ
		+		=	25 E/mL
	500 E		20 mL		20 mL

En-stegsspädning:	Ocplex/Confidex		Medföljande vätska		INJ-INF LÖ
		+		=	25 E/mL
	1000 E		40 mL		40 mL

Beredningsinstruktion: Ska iordningställas med medföljande vätska (20 mL eller 40 mL) och de material som medföljer förpackningen. Slutkoncentration 25 E/mL.
Följ instruktionen i bipacksedeln.

Skaka inte flaskan vid upplösning av pulvret, eftersom det kan leda till skumbildning.
Efter beredning ska lösningen vara klar och färglös. Använd den inte om den är grumlig.

Arbetsmiljö Biologiskt läkemedel, hantera enligt lokal instruktion, -

Administreringssätt

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-12-19 11:08:10
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-12-19 11:56:10
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sl.se

Läkemedelsnummer: 1428
ID/spårnummer: 4097
Giltig fr o m: 2017-12-19 11:56:10
Utskriftsdatum: 2017-12-19

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Protrombinkomplex intravenös inf/inj 25 E/mL (Confidex, Ocplex)

Intravenös injektion/infusion: ca 1 mL/min. Max 8 mL/min.

Bör administreras i separat kateter eller kateter-lumen.

Undvik att få in blod i sprutan. Annars finns risk att blodet koagulerar vilket kan leda till att ev bildat blodkoagel infunderas i patienten.

Vanlig indikation och dos

Reversering under behandling med vitamin K-antagonist

Initialt: 10 - 15 (- 25) E/kg

Vid behov kan dosen behöva upprepas utifrån INR-svar och andra laboratorieprovsvär.

Brist på K-vitaminberoende koagulationsfaktorer (inkl leverinsufficiens)

Initialt: 10 - 15 (- 25) E/kg

Vid behov kan dosen behövas upprepas utifrån INR-svar och andra laboratorieprovsvär.

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
10 E/kg	0,4 mL	2 mL	4 mL	20 mL
25 E/kg	1 mL	5 mL	10 mL	50 mL

Hållbarhet preparat:

Ocplex/Confidex (registrerad produkt)

- 25 E/mL, Injektions-/infusionsvätska, lösning

Hållbar: Efter iordningsställande: kan förvaras 8 tim (Ocplex) alt 24 tim (Confidex) rumstemperatur. Resterande lösning får ej sparas.

- 1 Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Hållbar: Förvaras vid högst 25°C. Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Övrig information

Innehåller:

- Koagulationsfaktor (human) II, VII, IX och X
- Protein C
- Protein S
- Heparin (100 - 250 E/injektionsflaska som hjälpämne)

Referens/Länk

FASS

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-12-19 11:08:10

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-12-19 11:56:10

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sl.se

Läkemedelsnummer: 1428

ID/spårnummer: 4097

Giltig fr o m: 2017-12-19 11:56:10

Utskriftsdatum: 2017-12-19

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Protrombinkomplex intravenös inf/inj 25 E/mL (Confidex, Ocplex)

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Svenska sällskapet för trombos och hemostas (SSTH)

<http://www.ssth.se/>

Rekommendation , (Grade 1C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

protrombin-komplex-concetrare, B02BD01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=ID85MIX574IDSM5RV1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-12-19 11:08:10

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-12-19 11:56:10

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sl.se

Läkemedelsnummer: 1428

ID/spårnummer: 4097

Giltig fr o m: 2017-12-19 11:56:10

Utskriftsdatum: 2017-12-19

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

