

Metronidazol oralt 40 mg/mL

(Flagyl) oral suspension

Ska omskakas innan användning.

Administreringsätt

Oralt

Enteralt i sond

Vanlig indikation och dos

Systemisk bakteriell infektion, inklusive intraabdominell infektion, med anaeroba bakterier känsliga för metronidazol

Nyfödda:

Doseringsintervall beror på gestationsålder och postnatal ålder:

Dag 0 - 7:

Gestationsålder vid födsel mindre än vecka 28: 7,5 mg/kg x 1

Gestationsålder vid födsel från vecka 28: 7,5 mg/kg x 2

Dag 8 - 28:

Oavsett gestationsålder vid födsel: 7,5 mg/kg x 2

Barn 1 - 2 mån: 7,5 mg/kg x 2 eller 15 mg/kg x 1

Barn 2 mån - 18 år:

7,5 mg/kg x 3, max 400 mg x 3 eller 20 - 30 mg/kg x 1, max 1 200 mg x 1.

Vid allvarlig infektion kan dosen ökas upp till 40 mg/kg/dygn, max 2 000 mg/dygn.

Behandlingstid: vanligen 7 - 14 dagar. För infektion med *Clostridium difficile* 10 - 14 dagar. Dentala infektioner 5 - 7 dagar.

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-04-04 11:28:13

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-04-21 08:35:36

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1437

ID/spårnummer: 3146

Giltig fr o m: 2017-04-21 08:35:36

Utskriftsdatum: 2017-04-24

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Metronidazol oralt 40 mg/mL

(Flagyl) oral suspension

Urogenitala infektioner så som *Trichomonas vaginalis* eller bakteriell vaginos

Barn under 10 år:

5 - 10 mg/kg x 3 eller 7,5 - 15 mg/kg x 2 eller engångsdos 40 mg/kg Max
2 000 mg per dos.

Barn över 10 år:

200 mg x 3 eller 400 mg x 2 eller 2 000 mg som engångsdos

Behandlingstid om ej engångsdos: 5 - 7 dagar

Amöbiasis

Barn 1 mån - 18 år: 12 - 17 mg/kg x 3, max 800 mg x 3

Behandlingstid: 5 - 10 dagar

Giardiasis

Barn 1 mån - 18 år: 8 - 13 mg/kg x 3, max 400 mg x 3

Behandlingstid: 6 dagar

Eradikering av *Helicobacter pylori*

Barn 1 mån - 18 år:

Som del i trippelbehandling eller sekvensbehandling:
10 mg/kg x 2, max 1 g/dygn

Behandlingstid:

Trippelbehandling: 7 - 14 dagar

Sekvensbehandling: 5 dagar (total behandlingstid 10 dagar)

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
7,5 mg/kg	0,19 mL	0,94 mL	1,88 mL	9,38 mL
10 mg/kg		1,25 mL	2,5 mL	12,5 mL

Hållbarhet preparat:

Metronidazol (registrerad produkt)

40 mg/mL, Oral suspension

Hållbar: Förvaras i originalförpackningen, ljuskänsligt. För infektionskänslig patient hållbar 1 mån efter första uttag, annars 6 mån.

Övrig information

För nyfödda med gestationsålder mindre än 40 veckor kan ackumulation av metronidazol ske under första levnadsveckan. Serumkoncentrationen bör

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-04-04 11:28:13

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-04-21 08:35:36

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1437

ID/spårnummer: 3146

Giltig fr o m: 2017-04-21 08:35:36

Utskriftsdatum: 2017-04-24

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Metronidazol oralt 40 mg/mL

(Flagyl) oral suspension

kontrolleras.

Suspensionen innehåller etanol och socker, tänk på god munhygien.

Metronidazol reagerar med aluminium. Använd inte lösningen om den har missfärgats eller om fällning har bildats.

Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/htm>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Svenska Barnläkarföreningen, Svenska Föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition, Vårdprogram Helicobacter pylori hos barn

<http://gastro.barnlakarforeningen.se/varprogram/>

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 1B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

Metronidazole, P01AB01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POCAU9E4MVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-04-04 11:28:13
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-04-21 08:35:36
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1437
ID/spårnummer: 3146
Giltig fr o m: 2017-04-21 08:35:36
Utskriftsdatum: 2017-04-24

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

