



## Metronidazol oralt 40 mg/mL

(Flagyl) oral suspension

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Färdigberedd oral suspension Flagyl 40 mg/mL

Metronidazol finns även som tabletter, se annan instruktion.

### ARBETSMILJÖ

Allergirisk, hantera enligt lokal rutin, -

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Omskakas innan varje administrering.

Oralt

Enteralt i sond:

Kan ges i nasogastrisk sond eller gastrostomi. Suspensionen är viskös och bör spädas med samma volym vatten precis innan administrering.

### ÖVRIG INFORMATION

Metronidazol reagerar med aluminium. Använd inte lösningen om den har missfärgats eller om fällning har bildats.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Metronidazol (registrerad produkt)

40 mg/mL, Oral suspension

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C i originalförpackningen, ljuskänsligt. För infektionskänslig patient hållbar 1 mån efter första uttag, annars 6 mån.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

För nyfödda med gestationsålder mindre än 40 veckor kan ackumulering av metronidazol ske under första levnadsveckan. Serumkoncentrationen bör kontrolleras.

#### Bakteriell infektion med anaeroba bakterier känsliga för metronidazol

Nyfödda:

Doseringsintervall beror på gestationsålder och postnatal ålder:

Dag 0 - 7:

Gestationsålder vid födsel mindre än vecka 28: 7,5 mg/kg x 1

Gestationsålder vid födsel från vecka 28: 7,5 mg/kg x 2

Dag 8 - 28:

Oavsett gestationsålder vid födsel: 7,5 mg/kg x 2

Barn 1 - 2 mån: 7,5 mg/kg x 2 eller 15 mg/kg x 1

Barn 2 mån - 18 år:

7,5 mg/kg x 3, max 500 mg x 3 eller 20 - 30 mg/kg x 1, max 1,2 g x 1

Vid allvarlig infektion kan dosen ökas upp till 40 mg/kg/dygn, max 2 g/dygn

Behandlingstid: 5 - 14 dagar beroende på indikation. För infektion med Clostridium difficile 10 - 14 dagar. Dentala infektioner 5 - 7 dagar.

#### Profylax i samband med operation

Nyfödda, gestationsålder under 40 veckor: 10 mg/kg

Nyfödda, gestationsålder över 40 veckor: 20 mg/kg

Barn 1 mån - 18 år: 20 mg/kg, max 1 g

Ges som engångsdos 2 - 3 timmar innan operationen startar.





## Metronidazol oralt 40 mg/mL

(Flagyl) oral suspension

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Urogenitala infektioner så som Trichomonas vaginalis eller bakteriell vaginos

Barn 2 mån - 9 år:

5 - 10 mg/kg x 3 eller 7,5 - 15 mg/kg x 2 eller engångsdos 40 mg/kg, max 2 g

Barn 10 - 18 år:

200 mg x 3 eller 400 mg x 2 eller 2 g som engångsdos

Behandlingstid om ej engångsdos: 5 - 7 dagar

#### Amöbiasis

Barn 2 mån - 18 år: 15 mg/kg x 3, max 800 mg x 3

Behandlingstid: 5 - 10 dagar

#### Giardiasis

Barn 2 mån - 18 år: 10 mg/kg x 3, max 400 mg x 3

Behandlingstid: 6 dagar

#### Eradikering av Helicobacter pylori

Barn 2 mån - 18 år:

Som del i trippelbehandling eller sekvensbehandling:

10 mg/kg x 2, max 1 g/dygn

Behandlingstid:

Trippelbehandling: 7 - 14 dagar

Sekvensbehandling: 5 dagar (total behandlingstid 10 dagar)

### RIMLIG DOS FÖR 40 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
7,5 mg/kg	0,19 mL	0,94 mL	1,88 mL	9,38 mL
10 mg/kg	0,25 mL	1,25 mL	2,5 mL	12,5 mL
30 mg/kg	-	3,75 mL	7,5 mL	37,5 mL



## Metronidazol oralt 40 mg/mL (Flagyl) oral suspension



### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 1B)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi,  
Hepatologi och Nutrition - Helicobacter pylori hos barn

<http://gastro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

---

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2018-12-05

ePedID: 1437

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-12-06

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2018-12-06

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**