

Fytomenadion oralt 20 mg/mL

(Vitamin K, Ka-Vit Tropfen licens) orala droppar

Instruktionen gäller för: Licenspreparat Ka-Vit Tropfen orala droppar 20 mg/mL.

Alternativa preparat är Konakion Novum injektionslösning 10 mg/mL (för peroralt bruk) och licenspreparat Neokay kapsel 1 mg, se andra instruktioner.

Beredningsinstruktion: Lösningen är en klar eller något grumlig, gul emulsion. Om lösningen är mycket grumlig och/eller blir orange-brun i färgen ska den kasseras.

1 droppe = 0,05 mL och innehåller 1 mg fytomenadion.
1 mL = 20 droppar och innehåller 20 mg fytomenadion.

Administreringssätt

Droppvis uppmätning kan göras när flaskan hålls helt upp och ner.

Ska tas tillsammans med lite vätska.

Oralt

Enteralt i sond

Vanlig indikation och dos

Förebyggande av vitamin K-beroende blödning hos nyfödda, alternativ endast i de fall intramuskulär/intravenös injektion inte kan ges:

- misstänkt/diagnostiserad blödarsjuka
- vårdnadshavare önskar peroralt alternativ

Fullgångna nyfödda:

Startdos: engångsdos 2 mg

Denna dos ges så snart som möjligt under första levnadsdygnet.

Därefter 1 mg 1 gång per vecka i 3 månader.

Vitamin K-brist, inkl. vid leversjukdom, neonatal kolestas, neonatal hypoprotrombinemi

Barn 0 - 18 år: 1 mg/kg, max 10 mg

Rimlig dos för barn

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
Vid födelse 1 mg		0,05 mL		

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2018-01-09 09:30:55

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-01-17 09:10:54

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sl.se

Läkemedelsnummer: 1440

ID/spårnummer: 4176

Giltig fr o m: 2018-01-17 09:10:54

Utskriftsdatum: 2018-01-17

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Fytomenadion oralt 20 mg/mL

(Vitamin K, Ka-Vit Tropfen licens) orala droppar

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
Vid födelse 2 mg		0,1 mL		
1 mg/kg, max 10 mg	0,05 mL	0,25 mL	0,5 mL	2,5 mL

Hållbarhet preparat:

Ka-vit (licensprodukt)

● 20 mg/mL, Orala droppar, lösning

Hållbar: Ljuskänsligt, förvaras i ytterkartongen. För infektionskänslig patient hållbar 1 mån efter första uttag, annars 3 mån. Förvaras i rumstemperatur.

Övrig information

Peroral profylax med vitamin K ska avbrytas om barnet i huvudsak (över 50 %) får sin näring/uppfödning via komjölkbaserad modersmjölkersättning som är berikad med vitamin K.

Peroral profylax med vitamin K kan vara otillräcklig hos barn med underliggande leversjukdom/kolestas eller malabsorption eller om modern behandlas med antikoagulantia, antiepileptika eller antituberkulostatika. Fortsatt behandling bör baseras på koagulationsstatus.

Referens/Länk

Micromedex

NeoFax

Personlig kontakt Maria Magnusson, MD, Spec koagulation- och blödningsrubbningar, ALB Stockholm

Rekommendation ,(Grade 1C)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Summary of Product Characteristics (SPC) KA-VIT Tropfen

Lokal länk

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1440

Substansspecifika uppgifter

Phytomenadione, B02BA01

<http://www.fass.se/lif/substance?substancelid=IDE4POBZU95LTVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2018-01-09 09:30:55

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-01-17 09:10:54

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1440

ID/spårnummer: 4176

Giltig fr o m: 2018-01-17 09:10:54

Utskriftsdatum: 2018-01-17

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

