



Fytomenadion oralt 20 mg/mL

(Vitamin K, Ka-Vit Tropfen licens) orala droppar

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Orala droppar 20 mg/mL (Ka-Vit Tropfen, licens)

1 droppe = 0,05 mL och innehåller 1 mg fytomenadion.
1 mL = 20 droppar och innehåller 20 mg fytomenadion.

Alternativa preparat är injektionslösning 10 mg/mL (för oralt bruk), tablett 10 mg (licens) och kapsel 1 mg (licens), se annan instruktion.

INGEN SPÄDNING

ORALA DR LÖS
20 mg/mL
10 mL

ADMINISTRERING

Droppvis uppmätning kan göras när flaskan hålls helt upp och ner.

Ska tas tillsammans med lite vätska.

Lösningen är en klar eller något grumlig, gul emulsion. Om lösningen är mycket grumlig och/eller blir orange-brun i färgen ska den kasseras.

Oralt

Enteralt

RIMLIG DOS för Fytomenadion oralt 20 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
1 mg (1 droppe)	-	0,05 mL	-	-
2 mg (2 droppar)	-	0,1 mL	-	-
1 mg/kg (1 droppe/kg)	0,05 mL	0,25 mL	-	-
Max 10 mg	-	-	0,5 mL	0,5 mL

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Förebyggande av vitamin K-beroende blödning hos fullgångna nyfödda,

ENDAST i de fall intramuskulär/intravenös injektion inte kan ges:

- misstänkt/diagnostiserad blödarsjuka
- vårdnadshavare önskar oralt alternativ

Fullgångna nyfödda:

Startdos: engångsdos 2 mg (2 droppar)

Denna dos ges så snart som möjligt under första levnadsdygnet.

Därefter 1 mg (1 droppe) 1 gång per vecka i 3 månader.

Förvärvad vitamin K-brist, inkl. vid leversjukdom, neonatal kolestas

Nyfödda: 1 mg/kg x 1 (1 droppe/kg x 1)

Barn 1 mån - 18 år: 1 mg/kg x 1, max 10 mg (1 droppe/kg x 1, max 10 droppar)

ÖVRIG INFORMATION

Oral profylax med vitamin K ska avbrytas om barnet i huvudsak (över 50 %) får sin näring via komjölsbaserad modersmjölk ersättning som är berikad med vitamin K.

Oral profylax med vitamin K kan vara otillräcklig hos barn med underliggande leversjukdom/kolestas eller malabsorption eller om modern behandlas med antikoagulantia, anti epileptika eller läkemedel mot tuberkulos. Fortsatt behandling bör baseras på koagulationsstatus.

Doseringen för förebyggande av blödning hos nyfödda i denna instruktion är från Svenska Neonatalföreningens riktlinje, samt andra källor, och skiljer sig därför från doseringen i FASS.





Fytomenadion oralt 20 mg/mL

(Vitamin K, Ka-Vit Tropfen licens) orala droppar

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Ka-vit (licensprodukt)

20 mg/mL, Orala droppar, lösning

Ljuskänsligt, förvaras i ytterkartongen. För infektionskänslig patient hållbar 1 mån efter första uttag, annars 3 mån. Förvaras i rumstemperatur.

REFERENS/LÄNK

Micromedex

NeoFax

Rekommendation , (Grade 1C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Summary of Product Characteristics (SPC) KA-VIT Tropfen

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Neonatalföreningen - Nationella riktlinjer för vitamin K profylax

<https://neo.barnlakarforeningen.se/riktlinjer-varldprogram/forlossnings-och-bb-varld-2/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1440

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 1440

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-08-21

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT