

NEXIUM, IV inf (Obs 2 steg)

esomeprazol 0,4 mg/ml

enl spädn-instruktion

OBS Flera styrkor och administreringsätt finns. Kontrollera att rätt instruktion används.

	<i>Inj-/inf lösning</i>			<i>stamlösning</i>
steg 1	40 mg		NaCl 9 mg/ml	8 mg/ml
	pulver	+	5 ml	= 5 ml
	<i>stamlösning</i>			<i>IV inf</i>
steg 2	8 mg/ml		NaCl 9 mg/ml	0,4 mg/ml
	5 ml	+	95 ml	= 100 ml

Beredningsinstruktion: Pulvret löses först upp i en liten mängd vätska (5 ml) och tillsättes sedan till resterade volym så totalt 100 ml erhålls. 100 ml påsar är överfyllda så konc blir ca 0,36-0,4 mg/ml.

Administrering: 30 min

Hållbarhet efter iordningställande: 12 tim i rt, ljusskyddad originalflaskan. Stamllösningen får pga risk för förväxling inte sparas.

Hållbarhet originalförp: Förvaras vid högst 30 C i originalkartongen. Ljuskänsligt.

Varunummer: 14558, Nexium pulv inj/inf 40mg Astra, 40 mg

Källa: FASS

Obs: Allergent läkemedel, hanteras enligt neo läkemedelshanteringsriktlinjer

Indikation: Reflux-esofagit

Vanlig dos: 1 mg/kg x 1

Vanlig dos	Vanlig dos omräknad till volym beroende på kroppsvikt för esomeprazol 0,4 mg/ml			
	0,5 kg	1 kg	2 kg	3 kg
1 mg/kg/dos	1,25 ml	2,50 ml	5,00 ml	7,50 ml