



## Amikacin intravenös inf/inj 10 mg/mL

(Biklin, Extempore)

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

- Alt. 1: Extemporeberedd amikacin 10 mg/mL
- Alt. 2 - 3: Spädning från Biklin 250 mg/mL

### EN-STEGSSPÄDNING Alt. 2

Biklin 250 mg/mL 0,5 mL	+ NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50 mg/mL 12 mL	= INJ-INF LÖ <b>10 mg/mL</b> 12,5 mL
-------------------------------	--	--

### EN-STEGSSPÄDNING Alt. 3

Biklin 250 mg/mL 2 mL	+ NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50 mg/mL 48 mL	= INJ-INF LÖ <b>10 mg/mL</b> 50 mL
-----------------------------	--	--

### ARBETSMILJÖ

Allergirisk, hantera enligt lokal rutin, -

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös infusion:

Ges i första hand som infusion under 30 - 60 min.

Intravenös injektion (3 - 5 min):

Alternativ om infusion inte är möjlig.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

Försiktighet vid asfyxi och njursvikt.

Viktigt att följa serumkoncentrationen (dalvärde) och njurfunktion pga oto- och/eller nefrotoxicitet, se Övrig information. Max kumulativ dos per kur 15 g.

För att undvika överdosering bör amikacin doseras utifrån vikt för medel-BMI för barnets ålder och längd.

#### Systemisk bakteriell infektion med bakterier känsliga för amikacin

Nyfödda:

Doseringssintervall beror på gestationsålder och postnatal ålder:

Dag 0 - 7:

Gestationsålder vid födsel mindre än vecka 28: 18 mg/kg var 36:e - 48:e timme

Gestationsålder vid födsel från vecka 28: 18 mg/kg var 36:e timme

Gestationsålder vid födsel äldre än vecka 36 (över 2,8 kg): 15 mg/kg x 1

Dag 8 - 28:

Gestationsålder vid födsel mindre än vecka 28: 18 mg/kg var 36:e timme

Gestationsålder vid födsel från vecka 28: 18 mg/kg x 1

Barn 1 mån - 18 år: 15 - 20 mg/kg x 1, max 1,5 g/dygn

Behandlingstid: vanligen 7 - 10 dagar

#### Bakteriell meningit

Barn 1 mån - 18 år: 7 - 10 mg/kg x 3, max 1,5 g/dygn

Behandlingstid: vanligen 7 - 10 dagar





## Amikacin intravenös inf/inj 10 mg/mL

(Biklin, Extempore)

### RIMLIG DOS för Amikacin intravenös inf/inj 10 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
7,5 mg/kg	-	3,75 mL	7,5 mL	37,5 mL
10 mg/kg	-	5 mL	10 mL	50 mL
15 mg/kg	-	7,5 mL	15 mL	75 mL
18 mg/kg	1,8 mL	9 mL	18 mL	90 mL

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Amikacin APL (extempore - ej lagervara)

10 mg/mL, Injektions-/infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Öppnad: flaska 28 dagar i kylskåp, spruta 8 dagar i kylskåp. Efter första uttag i injektionsflaska: 12 tim i rumstemperatur, 24 tim i kylskåp.

#### Biklin (från registrerad produkt)

250 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C. Bör ej sparas efter första uttag pga förväxlingsrisk. Alternativt ska inte färdigspädd lösning sparas. Efter första uttag: 12 tim i rumstemperatur, 24 tim i kylskåp.

10 mg/mL, Injektions-/infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: 12 tim i rumstemperatur, 24 tim i kylskåp.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Endokardit eller behandling av immunosupprimerade patienter

Dygnssdosen bör delas upp på 2 doseringstillfällen då det inte finns tillräckligt stöd för dosering 1 gång dagligen i dessa fall.

Barn 1 mån - 18 år: 7,5 mg/kg x 2, max 1,5 g/dygn

Behandlingstid: vanligen 7 - 10 dagar

### ÖVRIG INFORMATION

Viktigt att följa serumkoncentration (dalvärde) och njurfunktion under pågående behandling. Dalvärde (0-prov) tas vanligen upp till 30 min innan nästa dos, oftast under andra behandlingsdygnet samt därefter 2 - 3 gånger per vecka.

Mål för dalvärde:

2 - 5 mg/L för att minska risken för oto- och/eller nefrotoxicitet.

Dalvärdet indikerar om dosintervallen är adekvat gällande biverkningsrisk men kan även ge information om kortare tidsintervall skulle vara möjligt (vid terapisvikt).

Vid t.ex. låg dos eller tveksam behandlingseffekt kan även kontroll av toppkoncentrationen vara av värde. Prov tas 30 min efter avslutad infusion.

Mål för toppvärde:

Mellan 32 - 64 mg/L beroende på känt MIC-värde.





## Amikacin intravenös inf/inj 10 mg/mL

(Biklin, Extempore)

### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress RAF, Referensgruppen för antibiotikafrågor – Antibiotikakompendium

<https://www.sls.se/raf/lakemedel/antibiotikakompendium/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Neonatal Sepsis

<https://lv.se/neonatal-sepsis>

Micromedex

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Smits A et al., Prospective Evaluation of a Model-Based Dosing Regimen for Amikacin in Preterm and Term Neonates in Clinical Practice

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26248375>

Rekommendation ,(Grade 2B)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2020-02-05

ePedID: 2032

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-02-05

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2020-02-05

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT