

FENTANYL, IV inf, IV inj
fentanyl 5 mikrog/ml
enl spädn-instruktion

<i>inj lös</i>			<i>IV inf, IV inj</i>
50 mikrog/ml		glukos 50 mg/ml alt NaCl 9 mg/ml	5 mikrog/ml
1 ml	+	9 ml	= 10 ml

Beredningsinstruktion: Beställ med fördel färdigberett fentanyl 5 mikrog/ml från Apoteket.

Administrering: Inj 3-5 min alt kontin inf

Hållbarhet efter iordningställande: 12 tim i rt

Hållbarhet originalförp: Efter första uttag: 24 tim kyl, 12 tim rt om färdigbetett fentayl från apoteket.

Om brytampuller från B.Braun får resterande lösning ej sparas. Förvara ampullerna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Källa: FASS

Indikation: Sedation och analgesi inför intubation

Vanlig dos: 1-2-(4) mikrog/kg/dos

Vanlig dos	Vanlig dos omräknad till volym beroende på kroppsvikt för fentanyl 5 mikrog/ml			
	0,5 kg	1 kg	2 kg	3 kg
1 mikrog/kg/dos	0,10 ml	0,20 ml	0,40 ml	0,60 ml
4 mikrog/kg/dos	0,40 ml	0,80 ml	1,60 ml	2,40 ml