

## Läkemedel för injektion eller infusion

PAVURON, IV inj (Obs 2 steg)

papaverin 0,1 mg/ml

enl spädn-instruktion

	<i>inj lösn</i>			<i>stamlösning</i>
<b>steg 1</b>	25 mg/ml		glukos 50 mg/ml alt NaCl 9 mg/ml	2 mg/ml
	1 ml	+	11,5 ml	= 12,5 ml
	<i>stamlösning</i>			<i>IV inj</i>
<b>steg 2</b>	2 mg/ml		glukos 50 mg/ml alt NaCl 9 mg/ml	0,1 mg/ml
	0,5 ml	+	9,5 ml	= 10 ml

Administrering: 1-2 min

Hållbarhet efter iordningställande: Resterande lösning får ej sparas. Skyddas för ljus  
Hållbarhet originalförp: se förpackning

Källa: FASS

Obs: Allergent läkemedel, hanteras enligt neo läkemedelshanteringsriktlinjer

Indikation: Kärilspasm

Vanlig dos: 1,5 mg/kg x 4

Vanlig dos	Vanlig dos omräknad till volym beroende på kroppsvikt för papaverin 0,1 mg/ml			
	0,5 kg	1 kg	2 kg	3 kg
0,15 mg/kg/dos	0,75 ml	1,50 ml	3,00 ml	4,50 ml