

NOVOSEVEN, IV inj
rekombinant koagulationsfaktor VIIa 1 mg/ml
enl spädn-instruktion

<i>inj subst</i>			<i>IV inj</i>
1 mg		medföljande vätska	1 mg/ml
pulver	+	1 ml	= 1 ml

Beredningsinstruktion: Följ instruktion på bipacksedel. Tänk på att spruta in vätskan långsamt på glasampullens vägg för att minska skumbildning. Sväng flaskan vid blandning, skaka inte.

Administrering: 2-5 min

Hållbarhet efter iordningställande: 6 tim rt, 24 tim i kyl efter beredning.

Hållbarhet originalförp: Rekommenderas att förvaras i kyl. Kan dock förvaras vid högst 25 C i original kartong, ljuskänsligt. Får ej frysas.

Källa: FASS

Indikation: Koagulationsrubbnig

Vanlig dos: Ordineras av koagulationsjour! (90-120 mikrog/kg, ev upprepad dos efter 1-3 tim)

Vanlig dos	Vanlig dos omräknad till volym beroende på kroppsvikt för rekombinant koagulationsfaktor VIIa 1 mg/ml			
	0,5 kg	1 kg	2 kg	3 kg
90 mikrog/kg/dos	0,05 ml	0,09 ml	0,18 ml	0,27 ml
120 mikrog/kg/dos	0,06 ml	0,12 ml	0,24 ml	0,36 ml