

Koagulationsfaktor VIIa intravenös inj 1 mg/mL rekombinant, aktiverat, nyfödda

Ordineras i samråd med barnkoagulationsmottagning/koagulationsjour.

Denna instruktion lämpar sig för nyfödda.

Instruktionen gäller för: NovoSeven 1 mg pulver och vätska, slutkoncentration 1 mg/mL.
Fler styrkor finns men är mindre lämpade till nyfödda, se annan instruktion.

En-stegsspädning:	Novoseven		Medföljande vätska		INJ LÖ
	1 mg	+		=	1 mg/mL
	1 st		1 mL		1 mL

Beredningsinstruktion: Ska iordningställas med medföljande vätska.
Följ instruktionen i bipacksedel.

Rotera flaskan försiktigt vid upplösning av pulvret. Skaka inte, eftersom det kan leda till skumbildning.

Efter beredning ska lösningen vara klar och färglös. Använd den inte om den är grumlig.

Arbetsmiljö Biologiskt läkemedel, hantera enligt lokal instruktion, -

Administreringsätt

Intravenös injektion: vanligen 1 - 5 min.

Vid administrering ska produktnamn samt batchnummer eller motsvarande dokumenteras i journalen

Vanlig indikation och dos

Hemofili A eller B med antikroppar - Akut behandling

Ges så tidigt som möjligt när en blödningsperiod inträffar.

Vanlig dos: 90 - 100 mikrog/kg = 0,09 - 0,1 mg/kg

Upprepade doser krävs oftast. Kontakta koagulationsjour.

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-12-01 14:35:33

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-12-05 09:27:49

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 2100

ID/spårnummer: 3995

Giltig fr o m: 2017-12-05 09:27:49

Utskriftsdatum: 2017-12-05

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Koagulationsfaktor VIIa intravenös inj 1 mg/mL rekombinant, aktiverat, nyfödda

Kongenital faktor VII-brist - Behandling och profylax vid invasiva ingrepp

Vanlig dos: 15 - 30 mikrog/kg = 0,015 - 0,03 mg/kg

Upprepade doser krävs oftast. Kontakta koagulationsjour.

Glanzmanns trombasteni - Behandling och profylax vid invasiva ingrepp

Vanlig dos: 80 - 120 mikrog/kg = 0,08 - 0,12 mg/kg

Upprepade doser krävs oftast. Kontakta koagulationsjour.

Massiv blödning eller vid INR-stegring i särskilda fall (off-label)

OBS! Kontakta alltid koagulationsjour.

Vanlig dos: 100 mikrog/kg = 0,1 mg/kg

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,03 mg/kg	0,03 mL	0,15 mL		
0,1 mg/kg	0,1 mL	0,5 mL		

Hållbarhet preparat:

Novoseven (registrerad produkt)

● 1 mg, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Hållbar: Förvara pulver och spädningsvätska vid högst 25°C i originalförpackning. Ljuskänsligt. Får ej frysas. Efter iordningställande: bör användas omgående, men kan förvaras 6 tim rumstemperatur, 24 tim kylskåp. Detta gäller även styrkorna 2, 5 och 8 mg.

Övrig information

Novoseven innehåller rekombinant koagulationsfaktor VIIa benämnd eptacog alfa (aktiverad).

Referens/Länk

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Svenska sällskapet för trombos och hemostas (SSTH)

<http://www.ssth.se/>

Internetadress WHO - Internationell benämning av biologiska och bioteknologiska substanser

<http://www.who.int/medicines/services/inn/BioRevforweb.pdf>

Rekommendation ,(Grade 1B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe_cfm?show=grade

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-12-01 14:35:33

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-12-05 09:27:49

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sl.se

Läkemedelsnummer: 2100

ID/spårnummer: 3995

Giltig fr o m: 2017-12-05 09:27:49

Utskriftsdatum: 2017-12-05

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Koagulationsfaktor VIIa intravenös inj 1 mg/mL

rekombinant, aktiverat, nyfödda

Substansspecifika uppgifter

Eptacog alfa, B02BD08

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POHKUBQQ4VERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-12-01 14:35:33
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-12-05 09:27:49
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 2100
ID/spårnummer: 3995
Giltig fr o m: 2017-12-05 09:27:49
Utskriftsdatum: 2017-12-05

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

