



## Koagulationsfaktor VIIa intravenös inj 1 mg/mL

(Novoseven) rekombinant, aktiverat, nyfödda

**Ordineras i samråd med barnkoagulationsmottagning/koagulationsjour.**

**Denna instruktion lämpar sig för nyfödda.**

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

NovoSeven 1 mg pulver och vätska, slutkoncentration 1 mg/mL.  
Fler styrkor finns men är mindre lämpade till nyfödda, se annan instruktion.

### EN-STEGSSPÄDNING

|           |   |                    |   |         |
|-----------|---|--------------------|---|---------|
| Novoseven |   | Medföljande vätska |   | INJ LÖ  |
| 1 mg      |   |                    |   | 1 mg/mL |
|           | + |                    | = |         |
| 1 st      |   | 1 mL               |   | 1 mL    |

#### Beredningsinstruktion:

Ska iordningställas med medföljande vätska.  
Följ instruktionen i bipacksedeln.

Rotera flaskan försiktigt vid upplösning av pulvret. Skaka inte, eftersom det kan leda till skumbildning.  
Efter beredning ska lösningen vara klar och färglös. Använd den inte om den är grumlig.

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös injektion: vanligen 1 - 5 min.

Vid administrering ska produktnamn samt batchnummer eller motsvarande dokumenteras i journalen

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Hemofili A eller B med antikroppar - Akut behandling

Ges så tidigt som möjligt när en blödningsperiod inträffar.

Vanlig dos: 90 - 100 mikrog/kg = 0,09 - 0,1 mg/kg

Upprepade doser krävs oftast. Kontakta koagulationsjour.

#### Kongenital faktor VII-brist - Behandling och profylax vid invasiva ingrepp

Vanlig dos: 15 - 30 mikrog/kg = 0,015 - 0,03 mg/kg

Upprepade doser krävs oftast. Kontakta koagulationsjour.

#### Glanzmanns trombasteni - Behandling och profylax vid invasiva ingrepp

Vanlig dos: 80 - 120 mikrog/kg = 0,08 - 0,12 mg/kg

Upprepade doser krävs oftast. Kontakta koagulationsjour.

#### Massiv blödning eller vid INR-stegring i särskilda fall (off-label)

OBS! Kontakta alltid koagulationsjour.

Vanlig dos: 100 mikrog/kg = 0,1 mg/kg

### RIMLIG DOS FÖR 1 mg/mL

|            | 1 kg    | 5 kg    | 10 kg | 50 kg |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 0,03 mg/kg | 0,03 mL | 0,15 mL | -     | -     |
| 0,1 mg/kg  | 0,1 mL  | 0,5 mL  | -     | -     |



## Koagulationsfaktor VIIa intravenös inj 1 mg/mL

(Novoseven) rekombinant, aktiverat, nyfödda

---

### ÖVRIG INFORMATION

Novoseven innehåller rekombinant koagulationsfaktor VIIa benämnd eptacog alfa (aktiverad).

---

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Novoseven (registrerad produkt)

1 mg, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvara pulver och spädningsvätska vid högst 25°C i originalförpackning. Ljuskänsligt. Får ej frysas. Efter iordningställande: bör användas omgående, men kan förvaras 6 tim rumstemperatur, 24 tim kylskåp. Detta gäller även styrkorna 2, 5 och 8 mg.

---

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Medicininstruktioner

<https://www.medicininstruktioner.se/>

Internetadress Svenska sällskapet för trombos och hemostas (SSTH)

<http://www.ssth.se/>

Internetadress WHO - Internationell benämning av biologiska och bioteknologiska substanser

<http://www.who.int/medicines/services/inn/BioRevforweb.pdf>

Rekommendation , (Grade 1B)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

---

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2018-08-13

ePedID: 2100

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-08-13

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2018-08-13

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**