NATRIUMKLORID 4,5mg/ml(hypoton)+HEPARIN 0,2E/ml, IA inf (Obs 2 steg)

NaCl 4,5 mg/ml + heparin 0,2 E/ml

OBS Stor risk för förväxling. Kontrollera noggrant.

	inj lösn				*stamlösning*
steg 1	NaCl 9 mg/ml		sterilt vatten		NaCl 4,5 mg/ml
	25 ml	+	25 ml	=	50 ml

	stamlösning				*IA inf*
steg 2	NaCl 4,5 mg/ml		Heparin 100 E/ml		**NaCl 4,5 mg/ml + heparin 0,2 E/ml**
	50 ml	+	0,1 ml	=	50,1 ml

Beredningsinstruktion: En hypoton lösning innehåller en lägre koncentration lösliga partiklar än fysiologiska lösningar som fysiologisk natriumklorid 9 mg/ml som är isoton.

Administrering: Kontin inf. I perkutan artärkateter får endast NaCl 9 mg/ml alt NaCl 4,5 mg/ml med heparintillsats ges (i navelartärkateter får vissa andra infusionslösningar ges).

Hållbarhet efter iordningställande: 12 tim i rt, 24 tim kyl
Hållbarhet originalförp: Heparin: 12 tim rt, 24 tim kyl efter första uttag

Varunummer: 611426, Heparinlösn steril,

Källa: FASS

Indikation: Öppethållande av arteriell infart eller centralvenös infart.

Vanlig dos: 0,8-1 ml/tim