



## Fusidinsyra konjunktivalt 1 %

(Fucithalmic) ögonsalva

### ADMINISTRERINGSSÄTT

I nedre konjunktival-säcken:

Undvik kontamination av salvan genom att se till att tubens spets inte vidrör ögat eller annan yta.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Fucithalmic (registrerad produkt)

1 %, Ögonsalva

HÅLLBAR: Öppnad tub kan användas max 7 dagar till flera patienter och max 28 dagar till enskild patient.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Akut konjunktivit orsakad av stafylokokker

Nyfödda: 1 droppe i vardera öga x 2

Barn 1 mån - 18 år: 1 droppe i vardera öga x 2

Behandlingstid: behandling bör ske t.o.m. 2 dagar efter symtomfrihet för att förebygga recidiv.

### ÖVRIG INFORMATION

Ögonsalvan i tub innehåller bensalkoniumklorid som kan orsaka ögonirritation samt missfärga mjuka kontaktlinser.

Ingen typ av kontaktlinser ska användas under behandlingstiden.

### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 2D)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2019-10-10

ePedID: 2122

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-10-10

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2019-10-08

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**