

Fusidinsyra konjunktivalt 1 %

(Fucithalmic) ögonsalva

Administreringsätt

I nedre konjunktival-säcken: En pipett räcker till båda ögonen.

Vanlig indikation och dos

Akut konjunktivit orsakad av stafylokokker

Barn 0 - 18 år: 1 droppe i båda ögonen x 2

Behandlingstid: behandling bör ske t.o.m. 2 dagar efter symtomfrihet för att förebygga recidiv.

Hållbarhet preparat:

Fucithalmic (registrerad produkt)

● 1 %, Ögonsalva

Hållbar: Öppnad tub kan användas max 7 dagar till flera patienter och max 28 dagar till enskild patient.

Övrig information

Ögonsalvan i tub innehåller bensalkoniumklorid som kan orsaka ögonirritation samt missfärga mjuka kontaktlinser.

Ingen typ av kontaktlinser ska användas under behandlingstiden.

Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/htm>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 2D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

Fusidic acid, S01AA13

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POESU9YN7VERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2017-04-19 10:17:56

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-04-24 11:48:20

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 2122

ID/spårnummer: 3157

Giltig fr o m: 2017-04-24 11:48:20

Utskriftsdatum: 2017-05-12

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Fusidinsyra konjunktivalt 1 %

(Fucithalmic) ögonsalva

Substansspecifika uppgifter

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-04-19 10:17:56
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-04-24 11:48:20
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 2122
ID/spårnummer: 3157
Giltig fr o m: 2017-04-24 11:48:20
Utskriftsdatum: 2017-05-12

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

